


برنامه غذایی عمومی کلزا سبز آدینه



Follow: armansabzadine
@armansabzadineh

جهت تقویت ریشه زایی گیاه از محصول اسنشیال پلاس به مقدار ۳ لیتر در هکتار چند روز پس از انتقال نشاء به همراه آبیاری استفاده نمایید.

پیشنهاد می گردد جهت بهبود رشد و افزایش کیفیت محصول و همچنین جلوگیری از اثرات منفی تنش های محیطی از کودهای محرک رشد آکادین به میزان ۲/۵ کیلو در آب آبیاری و یا محلول پاشی استیمپلکس به میزان ۲ در هزار در طول دوره استفاده گردد.

جهت کاهش قلیائیت خاک و آزادسازی عناصر تثبیت شده و همچنین تامین فسفر قابل جذب گیاه از اسید فسفریک یوگاریت به میزان ۷ لیتر در هکتار به همراه آبیاری استفاده نمایید.

به منظور کاهش تنش شوری اطراف ریشه در خاکهای دارای EC بالا محلول **Out Salt** به میزان ۱۰۰ لیتر در هکتار در ۴ مرحله مصرف گردد.

زمان محلول پاشی می بایست در صبح زود و یا غروب به دور از نور مستقیم آفتاب باشد. (غلظت های توصیه شده می بایست رعایت گردد). در زمان تنش شدید خشکی از مصرف کود های شیمیایی خودداری شود.

مقدار مصرف	نحوه مصرف	نوع کود	زمان	کلزا
۱۵ کیلوگرم	همراه آبیاری	۱۰-۱۰۰-۳۰ ون ایپرن	بعد از ۲ برگ شدن تا قبل از روزت	
۱۵ کیلوگرم	همراه آبیاری	۲۰-۲۰-۲۰ ون ایپرن		
۲۰ کیلوگرم	همراه آبیاری	سولفات پتاسیم ون ایپرن		
۱۵ کیلوگرم	همراه آبیاری	۱۰-۱۰۰-۳۰ ون ایپرن	بعد از عید و قبل از گلدهی	
۲۰ کیلوگرم	همراه آبیاری	اوره فسفات	در زمان گل دهی و تشکیل غلاف ها	
۱ کیلوگرم	محلول پاشی	آزرون میکس		
۲۰ کیلوگرم	همراه آبیاری	سولفات پتاسیم ون ایپرن	در مرحله تشکیل پیله و دانه بندی	

* توجه: موارد توصیه شده کاملاً عمومی می باشد و به شرایط محیطی بستگی دارد، به دلیل آنکه این شرکت از زمان مصرف، نحوه مصرف و دز مصرف و شرایط جوی مصرف توسط مصرف کننده بی اطلاع است لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت وارد کننده نخواهد شد. قبل از استفاده از توصیه های فوق با کارشناس تغذیه شرکت مشورت گردد.