

تری فلورالین ۴۸ % امولسیون

Trifluralin 48% EC



موارد مصرف :

مصرف	نوع علف‌هرز	میزان و زمان مصرف
پنبه، چغندر قند، آفتابگردان و سویا	علف‌های هرز پهن برگ و نازک برگ	برای پنبه ۲ تا ۳ لیتر در هکتار قبل از کاشت بلافاصله مخلوط با خاک برای چغندر قند ۲ تا ۲/۵ لیتر در هکتار مخلوط با ۴ تا ۵ لیتر کلریدازون بعد از تنگ برای آفتابگردان و سویا ۱/۵ تا ۲/۵ لیتر قبل از کاشت مخلوط با خاک

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود.

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمک‌های اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف کش به پزشک مراجعه گردد.

پانزهر:

این سم‌پاژ هر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بی‌هوش چیزی خورانده نشود.

فرمول شیمیایی: $C_{13}H_{16}F_3N_3O_4$

وزن مولکولی: (۳۳۵/۳)

گروه: Dinitroaniline

ماده مؤثر: ۴۸۰ گرم برلیتر

مواد همراه: ۵۲۰ گرم برلیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD₅₀ for Rats > 5000 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

U (سمیت حاد ندارد)

نحوه تأثیر:

انتخابی، جذب از طریق هیپوکوتیل، اختلال در تقسیم سلولی و


بازدارنده رشد ریشه.



توق



گاو پنبه



سوروف



تاج خروس ریشه

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.