

فنوکسپروپ پی اتیل + ایمن کننده مفن پیر دی اتیل ۷/۵ %

امولسیون روغن در آب

Fenoxaprop-p-ethyl + Mefenpyr-diethyl 7.5 % EW

موارد مصرف :



میزان و زمان مصرف	نوع علف‌هرز	محصول
۰/۸ تا ۱ لیتر در هکتار (بعد از رویش در مرحله پنجه زدن علف‌های هرز)	علف‌های هرز کشیده برگ	گندم و جو

غشاء سلولی در نقاط رویشی علف هرز جلوگیری به عمل می‌آورد و نهایتاً منجر به مرگ گیاه می‌شود.

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمک‌های اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف‌کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر:

این علف‌کش پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

فرمول شیمیایی: $C_{18}H_{16}ClNO_5$

وزن مولکولی (۳۶۱/۸)

گروه Aryloxy phenoxy propionate

ماده مؤثر: ۷۵ گرم برلیتر

مواد همراه: ۹۲۵ گرم برلیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rat 3150 - 4000 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

III (احتیاط)

نحوه تأثیر:

انتخابی، سیستمیک و تماسی که توسط بافت های سبز گیاه جذب و به نقاط رویشی در برگ، ساقه و ریشه منتقل می‌گردد. مانع ساخت اسید چرب می‌شود و از تشکیل بعدی



قیاق



پولای وحشی



ایوارسلام

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.