

دستورالعمل فنی و اجرایی مبارزه با سن غلات



سن معمولی گندم *Eurygaster integriceps* Put.

نحوه نمونه برداری از مزارع برای سنجش زمان مبارزه با سن گندم

- ۱- حرکت از حاشیه مزرعه در قطر مزرعه (بازای هر ۱۰ قدم
یک تور با زاویه ۹۰ درجه)**
- ۲- هر ۷ تور معادل یک مترمربع می باشد.**



نحوه کنترل سن گندم در سنین مختلف در گندم و جو

ردیف	محصول	مرحله رشدی سن	نوع کشت	عملکرد پیش بینی شده (تن)	حداقل تعداد سن در مترمربع جهت مبارزه
۱	گندم	مادر	آبی	> ۳	۳
			آبی	< ۳	۲
			دیج	> ۲	۲
			دیج	< ۲	۰.۵
		پوره	آبی	> ۳	۵
			آبی	< ۳	۴
			دیج	> ۲	۴
			دیج	< ۲	۳
۲	جو	مادر	آبی	> ۳	۶
			آبی	< ۳	۵
			دیج	> ۲	۴
			دیج	< ۲	۳
		پوره	آبی	> ۳	۱۴
			آبی	< ۳	۱۲
			دیج	> ۲	۱۰
			دیج	< ۲	۸

سموم قابل توصیه برای کنترل جمعیت سن گندم در مزرعه

بعد از انجام نمونه برداری و رسیدن تعداد سن ها به سطح مبارزه، سمپاشی با سموم زیر قابل انجام است:

۱- فنیتروتیون (یک لیتر در هکتار)

۲- دلتامترین (EC 2.5% , SC 2.5%) (۳۰۰ سی سی در هکتار)

۳- لامبادا سی هالوترین SC 5% (۱۵۰ سی سی در هکتار)

۴- لامبادا سی هالوترین SC 10% (۷۵ سی سی در هکتار)