


بذور کلزای هیبرید زمستانه آلمان NPZ



شرکت آرمان سبز آدینه
ARMAN SABZ adineh co.
تامین کننده بهترین نهاده های کشاورزی

LS



شرکت آرمان سبز آدینه مفتخر است که با تامین کلیه نیازهای کشاورزان گرامی، توانسته است به جایگاه رفیع در بازار کشاورزی ایران دست یابد و نقش بسزایی در انتقال دانش و تکنولوژی روز کشاورزی به میهن عزیzman ایفا نماید.

سبد محصولات شرکت آرمان سبز آدینه عبارتند از:

- ۱- انواع تراکتورهای LS اکرله جنوبی
- ۲- کودهای ماکرو و میکرو شیمیایی و کودهای ارگانیک و بیولوژیک حاصلخیز کننده خاک از شرکت‌های معتبر جهان
- ۳- سوموم شیمیایی از شرکت‌های معتبر دنیا
- ۴- ارقام مختلف بذور ذرت، گندم، جو، سبزی، صیفی و کلزا
- ۵- ادوات و ابزار کشاورزی

آدرس: تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی شمالی - بن بست صبا - پلاک ۴

تلفن واحد فنی: ۰۲۱ - ۸۳۵ ۷۳۹۹

تلفن واحد فروش: ۰۲۱ - ۸۳۵ ۷۳۰۰

واردات و توزیع توسط:
شرکت آرمان سبز آدینه
ARMAN SABZ adineh co.

راز سرزمینهای حاصلخیز
The secret of Prolific Farms
تامین کننده بهترین نهاده های کشاورزی



علف های هرز، آفات و بیماری های مهم مزارع کلزا

مشخصات سه‌موم	سموم پیشنهادی چهت مبارزه شیمیایی	عوامل مهم خسارت را
دو منظوره و پس رویشی	لونترل (کلوپیرالید)	علف های هرز خردل، وحشی، ترچه وحشی، شلمی، یولاف وحشی و علف خونی
باریک برگ کش و پس رویشی	کالانت سوپر (هالوکسی فوب ارمتیل استرا)	
دو منظوره، پس از کاشت و قبل از سبز شدن گیاه	بوتیزان استار (متازاکلر + کوئین مراک)	
-	فولیکور (تبو کو نازول EW ۲۵٪)	بیماری ساق سیاه (فوما)
-	فولیکور (تبو کو نازول EW ۲۵٪)	بیماری پوسیدگی اسکلر و تینیایی
حضره کش سیستمیک همراه با اثر تتماسی و گوارشی حشره کش انتخابی با اثر سریع و خاصیت تدخینی	کنفیدور (ایمیداکلوبیرید) پریمور (پریمیکارب)	آفت شته مومن
**توجه: توصیه سه‌موم پیشنهادی بیماری های فوما و پوسیدگی اسکلر و تینیایی، بر اساس دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی برای تولید کلزا و سایر موارد بر اساس دستورالسامعان حفظ نباتات می باشد.		

برنامه غذایی کلزا

اوره	قبل از کاشت
سولفات پتابسیم	
سوپر فسفات تریپل	
اسید هیومیک مایع	زمان کاشت (بذرمال)
اسید هیومیک، کلات ریزمغذی، میکس NPK 30 - 10 - 10	پس از پایان دوره سرما (پس از پایان رزت) و قبل از ساقه دهی
NPK 30 - 10 - 10	اوخر ساقه دهی و قبل از گلدهی
سولفات پتابسیم	پس از گلدهی و آغاز تشکیل خورجینها

توجه: دستورالعمل توصیه شده سه‌موم و کودها بصورت کلی بوده و برای حصول نتیجه مطلوب بهتر است با کارشناسان کشاورزی منطقه مشورت شود.

اهمیت زراعی کلزا:

تحقیقات داخلی و خارجی و همچنین تجربیات کشاورزان کلزا در دو دهه اخیر نشان داده است که زراعت این محصول در تناب و با غلات و برخی از محصولات دیگر علاوه بر کاهش جمعیت علفهای هرز، آفات و بیماریها، باعث بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش پایداری عملکرد کشت‌های بعدی نظیر گندم، پنبه و ذرت می‌شود.

اهمیت اقتصادی کلزا:

کلزا گیاهی زراعی است که ۴۶ تا ۴۴ درصد رogen خوراکی بسیار مرغوب از دانه آن استخراج می‌گردد که بدیل دارا بودن اسیدهای چرب غیر اشباع و میزان کم اسیدهای چرب اشباع، از مرغوب ترین رogen های خوراکی محسوب می‌شود. کنجاله کلزا نیز با دارا بودن ۳۵ تا ۳۷ درصد پروتئین، می‌تواند در خوراک دام مورد استفاده قرار گیرد. از طرفی کشت کلزا در پاییز و نیاز آبی کم آن نسبت به محصولات تابستانه و همچنین عملکرد بالای ارقام هیبرید آن و با توجه به خرید تضمینی محصول کلزا توسط دولت محترم، می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه های کشاورزان و افزایش درآمد آنها داشته باشد.

با توجه به میزان بالای واردات رogen خوراکی جب تا مین نیاز غذایی کشور، کشت کلزا می‌تواند نقش موثری در کاهش وابستگی کشور به واردات رogenهای خوراکی و دانه های رogenی داشته باشد.

مزیت های کشت ارقام هیبرید کلزا:

ارقام هیبرید کلزا مزیت های بسیاری نسبت به ارقام آزاد گرده افشاران (OP) دارند و این موضوع باعث شده است بسیاری از سطوح کشت کلزا به ارقام هیبرید اختصاص یابد. استقبال متخصصان و کشاورزان به کشت ارقام هیبرید به عملکرد بالاتر آنها نسبت به ارقام آزاد گرده افشاران، یکنواختی در رسیدگی خورجین ها، مقاومت به ورس، مقاومت به سرما و جوانه زنی سریع و یکنواخت بذور بر می‌گردد.



خصوصیات زراعی ارقام هیبرید زمستانه NPZ آلمان

ردیف	رقم	تیپ	زمستانه	عملکرد دانه	قابلیت زمستانی گذرانی	شروع گلدهی	رسیدگی	مقاومت به ورس	تراکم کاشت
۱	آتورا (Atora)	زمستانه	خیلی زیاد	زیاد	نسبتاً زود	میان رس	بالا	در هر مترمربع ۲۵ - ۴۰ بوته	تراکم کاشت
۲	روهان (Rohan)	زمستانه	خیلی زیاد	زیاد	زود	زود رس میان رس	بالا	در هر مترمربع ۲۵ - ۴۰ بوته	تراکم کاشت
۳	گارو (Garou)	زمستانه	خیلی زیاد	خیلی زیاد	زود	زود رس میان رس	بالا	در هر مترمربع ۲۵ - ۴۰ بوته	تراکم کاشت

میزان بذر مصرفی ارقام هیبرید زمستانه کلزا ۴ کیلوگرم در هکتار است. این ارقام سازگاری خوبی با بافت‌های مختلف خاک دارند. زمان مناسب کاشت ارقام فوق از اوایل شهریور تا هفته اول مهرماه می‌باشد.

اقلیم‌های مناسب برای کاشت ارقام فوق:
اقلیم‌های سرد و سرد-معتدل کشور

ARMAN SABZ adineh co.
The secret of Prolific Farms



نکات مهم کاشت، داشت و برداشت کلزا کاشت:

از آنجایی که بذر کلزا ریز می باشد، تبیه بستر کاشت مناسب جهت سبز شدن یکنواخت و ایجاد تراکم بوته کافی از اقدامات اولیه حصول عملکرد بالا می باشد. لذا برای تبیه بستر مناسب کاشت و همچنین کشت صحیح رعایت شرایط زیر ضروری است :

- شخم زمین توسط گاوآهن برگردان دار و سپس دیسک و ماله کشیدن زمین جهت خرد شدن کلخها و بقایای محصول قبلی و همچنین یکنواختی خاک مزرعه
 - پخش کودهای نیتروژن، فسفره و پتاسه مورد نیاز به صورت یکنواخت در سطح مزرعه و اختلاط آنها با خاک توسط دیسک سبک یا همزمان با دستگاه بذرکار
 - کشت بذر در عمق ۱-۲ سانتی متر خاک جهت افزایش یکنواختی سطح سبز مزرعه و افزایش سرعت رشد بوته
- داشت :

- آبیاری: تعداد دفعات آبیاری بسته به نزولات جوی و شرایط بارندگی و خاک مزرعه معمولاً ۲-۳ مرتبه در پاییز و ۳-۴ مرتبه در مراحل ساقه دهی، گلهای و پرشدن دانه می باشد.

تغذیه: جهت تأمین نیاز غذایی گیاه کلزا در طول دوره رشد و نمو آن مصرف عنصری همچون نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، منیزیم، آهن، روی و منگنز لازم و ضروری می باشد. این دستورالعمل کلی بوده و بهترین توصیه تغذیه‌ای بر مبنای آزمون تجزیه خاک و توصیه موسسه تحقیقات می باشد. (برنامه تغذیه عمومی کلزا در بخش پایانی کاتالوگ ذکر شده است).

- مبارزه با آفات، بیماریها و علفهای هرز: از آفات و بیماری های مهم کلزا که در اغلب مناطق مشاهده می شوند می توان به آفت شته مومن کلزا و بیماریهای قارچی فوما و اسکلروتینیا اشاره نمود. همچنین خردل وحشی، ترپچ وحشی، شلمی، یولاف وحشی و خونی واش از علفهای هرز مهم مزارع کلزا می باشند که می توان با استفاده از سموم شیمیائی آنها را کنترل نمود. (سموم پیشنهادی جهت کنترل آفات، بیماریها و علفهای هرز مهم در بخش پایانی کاتالوگ ذکر شده است).

برداشت: در برداشت مستقیمه، وقتی ۹۰-۸۵ درصد دانه های غلاف های ساقه اصلی و شاخه های اولیه به رنگ قهوه ای روشن یا تیره متمایل شدند، می توان محصول را کمباین برداشت نمود.

در این حالت، تنظیمات کمباین باید به درستی انجام شود. هدکمباین تا حد ممکن در بالاترین سطح قرار گیرد، به طوری که غلاف های کلزا از پشت به داخل کمباین هدایت کند. سرعت هد تقریباً ۱۵ درصد بیشتر از سرعت حرکت کمباین باشد. همچنین ارتفاع هلیس از کف پلات فرم ۱۲-۲۰ میلی متر و فوامیل در طرفین کاملاً یکسان باشد. دور استوانه کوبنده نیز ۶۲-۵۸ درجه دقتیه تنظیم گردد.

علفهای هرز، بیماری ها و آفت مهم مزارع کلزا

علف هرز تربیجه وحشی



علف هرز یولاف وحشی



آفت شته مومن کلزا



بیماری اسکلروتینیای ساقه

