

فن والریت ۲۰ % امولسیون

Fenvalerate 20 % EC



موارد مصرف :

میزان مصرف	آفات	محصول
۱ لیتر در هکتار محلول پاشی	پروندیا	چغندر قند
۰/۵ در هزار محلول پاشی	مینوز لکه گرد	درختان میوه

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب حشره کش به پزشک مراجعه گردد.

بازنهی:

این سم پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

مدیریت کاربرد :

برای زنبور عسل و آبزبان فوق العاده خطرناک است. از آلوده نمودن منابع آبی با این سم جداً خودداری شود.

دوره کارنس:

فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول ۱۴ روز است.

فرمول شیمیایی:  $C_{25}H_{22}ClNO_3$

وزن مولکولی: (۴۱۹/۹)

گروه: Pyrethroid

ماده مؤثر: ۲۰۰ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۸۰۰ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rats 451 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان آور)

نحوه تاثیر:

حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی و کمی خاصیت کده کشی .

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.



مینوز لکه گرد



پروندیا



پرونده مینوز

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

**توجه:** موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.