

Butachlor 60% EC



موارد مصرف :

مصرف	نوع علف‌هرز	محصول
میزان و زمان مصرف ۳ تا ۴ لیتر در هکتار ۴ تا ۷ روز پس از نشا.	علف‌های هرز یکساله کشیده برگ و برخی پهن برگ‌ها، قبل از رویش در مزرعه و خزانه	برنج

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سر درد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهی:

آنتروپین، هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

مدیریت کاربرد:

اثر این سم به میزان آبی که در دسترس گیاه می باشد بستگی دارد. لذا برای کسب

نتیجه بهتر باید بعد از بارندگی و یا آبیاری و در زراعت های برنج بعد از تخت آب

نمودن مصرف شود.

فرمول شیمیایی: $C_{17}H_{26}ClNO_2$

وزن مولکولی: (۳۱۱/۹)

گروه: Chloroacetamide

ماده مؤثر: ۶۰۰ گرم بر لیتر

مواد همراه: ۴۰۰ گرم بر لیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD₅₀ for Rats 2000 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان‌آور)

نحوه تأثیر:

انتخابی، سیستمیک، بازدارنده سنتز پروتئین که توسط جوانه های در حال

رشد جذب می شود.



سوروی



اویار سلام

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.