

پرومترین ۸۰٪ پودر با قابلیت ترشوندگی  
Prometryn 80% WP

موارد مصرف :



میزان و زمان مصرف	نوع علف‌هرز	محصول
۱-۲ کیلوگرم در هکتار بلافاصله بعد از کاشت به صورت پیش رویشی	علف‌های هرز کشیده برگ و پهن برگ یکساله	پنبه

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سر درد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف کش به پزشک مراجعه گردد.

پانزهن:

پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

مدیریت کاربرد:

رطوبت مناسب جهت تاثیر بهتر علفکش ضروری است.

فرمول شیمیایی:  $C_{10}H_{19}N_5S$

وزن مولکولی: (۲۴۱/۴)

گروه: 1,3,5 triazine

ماده مؤثر: ۸۰۰ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۲۰۰ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای یستادناران:

Oral LD<sub>50</sub> for Rats > 2000 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

III (احتیاط)

نحوه تأثیر:

انتخابی، سیستمیک، بازدارنده عمل فتولیز آب در پدیده فتوستنز، جذب

از طریق ریشه و برگ.



خرمه



پنیرک



مرغ خوشه سرخ

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

**توجه:** موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.