



هالوکسی فوپ آر متیل استر ۱۰/۸% امولسیون Haloxypop-R-Methyl Ester 10.8 % EC

موارد مصرف :

میزان و زمان مصرف	نوع علف‌هرز	محصول
۱-۰/۷۵ لیتر در هکتار	علف‌های هرز باریک برگ	چغندر قند
۰/۶-۰/۷۵ لیتر در هکتار	علف‌های هرز باریک برگ	پیاز
۰/۵-۰/۷ لیتر در هکتار	علف‌های هرز باریک برگ	کلزا

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمک‌های اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر:

هالوکسی فوپ آر متیل استر پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

فرمول شیمیایی: $C_{16}H_{13}F_3ClNO_4$

وزن مولکولی: (۳۷۵/۷)

گروه: Aryloxyphenoxy propionate

ماده مؤثر: ۱۰۸ گرم بر لیتر

مواد همراه: ۸۹۲ گرم بر لیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for rats 300(male), 623(female) mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان آور)

نحوه تأثیر:

علف‌کش انتخابی، مانع رشد بافت‌های مریستمی، بازدارنده استیل‌کوآنزیم

T-کربوکسیلاز (Accase).



برولاک وحشی



قیاق

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.