

ایپرودیون + کاربندازیم ۵۲/۵% پودر با قابلیت ترشوندگی

Iprodione + carbendazim 52.5% wp

موارد مصرف :



میزان مصرف	بیماری	محصول
یک کیلوگرم در هکتار	شیت بلایت	برنج
یک در هزار	خشکیدگی سرشاخه	توت
یک در هزار	لکه قهوه‌ای نواری جو	جو

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برجسب قارچ کش به پزشک مراجعه گردد.

بازدهی:

این سم بازدهی اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیوهوش چیزی خورانده نشود.

فرمول شیمیایی: $C_{13}H_{13}O_3N_3Cl_2 + C_9H_9N_3O_2$

وزن مولکولی: (۱۹۱/۲) + (۳۳۰/۲)

گروه Dicarboximate+ Benzimidazole

ماده مؤثر: ۵۲۵ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۴۷۵ گرم بر کیلوگرم

برجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for rats > 5000 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

لا (سمیت حاد ندارد)

نحوه تأثیر:

قارچ کش سیستمیک و تماسی با دامنه تأثیر وسیع می باشد. همچنین با جلوگیری

از باروری اسپورها و رشد میسلیموم به عنوان عامل پیشگیری و درمان

استفاده می شود.



شیت بلایت برنج



لکه قهوه ای نواری جو

زیر نظر متخصصین گیاهپزشکی مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.

1394 - 1395

www.adinehgroup.com