

پنکونازول ۲۰% امولسیون روغن در آب

Penconazole 20% EW



موارد مصرف :

میزان مصرف	بیماری	معصول
۱۲۵ / ۰ در هزار	سفیدک سطحی	انگور

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

مکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب قارچ کش به پزشک مراجعه گردد.

پانزهر:

پنکونازول پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

مدیریت کاربرد:

این سم بازدارنده دی متیلاسیون استروئیدها است .

دوره کارنس :

فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول ۴ روز می باشد .

فرمول شیمیایی $C_{13}H_{15}Cl_2N_3$

وزن مولکولی (۲۸۴/۲)

گروه Triazole

ماده مؤثر: ۲۰۰ گرم برلیتر

مواد همراه: ۸۰۰ گرم برلیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rats 2125 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

III (احتیاط)

نحوه تأثیر:

پنکونازول قارچ کشی سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج که از طریق برگ جذب

شده و به سایر نقاط گیاه جابجا می شود.



سفیدک سطحی می

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد تومیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.