

دیفنوکونازول ۳% پودر برای ضدغفونی خشک بذر

Difenoconazole 3% DS



موارد مصرف :

میزان مصرف	پسماری
ضدغفونی بذر به میزان ۱ در هزار	سیاهک پنهان معمولی
ضدغفونی بذر به میزان ۲ در هزار	سیاهک آشکار
ضدغفونی بذر به میزان ۵ گرم برای ۱ کیلو گرم بذر	سیاهک پنهان و سیاهک پاکوتاه

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، اسهال، نهوع و اختلال در بینایی

مکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب قارچ کش به پزشک مراجعه گردد.

بادزه:

دیفنوکونازول پادزه اختشاصی ندارد. هرگز به مسمومیت یهوش چیزی خورانده نشود.

C19H17CL2N3O3

(۴۶٪)

Azole

ماده مؤثر: ۳۰ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۹۷۰ گرم بر کیلو گرم

درجہ سمیت برای پستانداران:

Oral LD₅₀ for rats 1453 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II(سمی و زیانآور)

نحوه تاثیر:

قارچ کش سیستمیک برای پیشگیری و درمان، بازدارنده بیوسنتز ارگوسترونول

می باشد.



سیاهک پنهان گردم



سیاهک آشکار گردم



سیاهک پاکوتاه گردم

زیر نظر متخصصین گناهپر شک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده

از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار ذر مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلال آن با

سایر سموم و ترکیبات شیمیایی مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسوولیتی متوجه

وارد کننده نمی باشد.