برنامه غذایی دانه داران

(سیب، به، گلابی)

		زمستان	هنگام تورم جوانه ها	بلافاصله بعد از ریزش گلبرگ ها (تشکیل میوه)	۲۰ روز بعد از ریزش گلبرگ ها	۳۰ روز بعد از ریزش گلبرگ ها (فندقی شدن)	دو ماه بعد از ریزش گلبرگ ها (گردویی شدن)	پس از برداشت	دو هفته پس از ریزش تا دو هفته قبل از برداشت (هر دو هفته یکبار)
گرانوله ۱۷ – ۱۲ – ۱۲	۵۰۰ الی ۷۰۰ گرم برای هر درخت	چالکود							
گرانوله ۱۰ – ۵ – ۱۰	۵۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم برای هر درخت	چالکود							
گلدن ست	۲ لیتر در هزار لیتر		محلول پاشی						
هیومیکا	۱۵ لیتر در هکتار		آبیاری						
کلفوس	۵ لیتر در هکتار | ۵ لیتر در هزار لیتر آب			آبیاری (۵ لیتر در هکتار)					محلول پاشی (۵ لیتر در هزار لیتر آب)
گرومستر	۶۰ الی ۸۰ سی سی برای هر درخت			آبیاری (۶۰ سی سی برای هر درخت)		آبیاری (۸۰ سی سی برای هر درخت)			
آرمادین	۲ کیلوگرم در هکتار			آبیاری					
۲۰ – ۲۰ – ۲۰	۲۰ کیلوگرم در هکتار			آبیاری					
۱۲ – ۱۲ – ۳۶	۱۰ کیلوگرم در هکتار				آبیاری				
میکرومان	۲ الی ۴ لیتر در هزار لیتر آب				محلول پاشی (۴ لیتر در هزار لیتر آب)		محلول پاشی (۲ لیتر در هزار لیتر آب)		
فوسیکا پلاس	۲ لیتر در هزار لیتر آب				محلول پاشی				
آرمینو آهن	۳ لیتر در هزار لیتر آب				محلول پاشی				
آرمینو منگنز	۳ لیتر در هزار لیتر آب				محلول پاشی				
آرمینو روی	۳ لیتر در هزار لیتر آب				محلول پاشی				
بورامین	۳ لیتر در هزار لیتر آب				محلول پاشی				
سولفات پتاسیم	۲۰ کیلوگرم در هکتار					آبیاری	آبیاری		
۳۰ – ۱۰ – ۱۰	۲۰ کیلوگرم در هکتار						آبیاری		
فال ست	۳ لیتر در هزار لیتر آب							محلول پاشی	
آرمینو کلسیم	۳ لیتر در هزار لیتر آب								محلول پاشی
کلبومکس	۳ لیتر در هزار لیتر آب								محلول پاشی
جیپ فرت	۲۰ لیتر در هکتار	آهکی بودن خاک | همراه با آبیاری							
دسالت	۲۰ لیتر در هکتار	شوری و سدیمی بودن خاک | همراه با آبیاری							
نیتروسید	۲۰ لیتر در هکتار	قلیایی بودن خاک | همراه با آبیاری							
آرمافیت	۲ لیتر در هزار لیتر آب	افزایش سیستم ایمنی و کنترل برخی بیماری های قارچی در مراحل اولیه حمله (هر ۲ الی ۳ هفته یکبار) | محلول پاشی							
لیکومان	۲ لیتر در هزار لیتر آب	در صورت بروز تنش و ضعف کلی گیاه | محلول پاشی							
آرماشیلد	۲ لیتر در هزار لیتر آب	افزایش سیستم ایمنی و کنترل برخی بیماری های قارچی و حمله آفات در مراحل اولیه حمله (به صورت ماهانه) | محلول پاشی							
هیومیکا	۱۵ لیتر در هکتار	مشاهده ضعف در گیاه (در خاک های فقیر از ماده آلی حتما باید استفاده کرد) | همراه با آبیاری							
آرماپلکس	۵ لیتر در هکتار	مشاهده ضعف در گیاه (در خاک های فقیر از ماده آلی حتما باید استفاده کرد) | همراه با آبیاری							
سورفکشن	۲۵۰ سی‌سی در هزار لیتر آب	به همراه کودها و سموم برای جذب بهتر؛ خصوصا در شرایطی که باد باشد یا احتمال بارندگی بعد از محلول پاشی وجود داشته باشد. | محلول پاشی							
گروئینگ ای ام	با کاهش هر واحد pH ۵۰ الی ۸۰ سی‌سی در صد لیتر آب	کاهش pH آب، استفاده از سموم که نیاز به pH اسیدی آب دارند. | محلول پاشی							
هلیکس	۲ الی ۳ لیتر در هزار لیتر آب	دور کردن برخی حشرات و کاهش pH خاک | محلول پاشی							

در هر بار مصرف بهتر است از یکی از کودهای عنوان شده استفاده شود

با توجه به اولویت بندی ها، در هر مرحله می‌توان کود مورد نیاز گیاه را انتخاب کرد.

بیشتر

کمتر

این ترکیبات را می‌توان در هر مرحله از رشد با توجه به مشکل ایجاد شده یا نیاز استفاده کرد.