

مهر ماه

شماره سوم

۱۴۰۵-۱۴۰۶

بولتن هفتگی هواشناسی کشاورزی



اداره ایستگاه های هواشناسی کشاورزی

بسمه تعالی

وزارت راه و شهر سازی

سازمان هواشناسی کشور


اداره کل شبکه دیدبانی

خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی (هفته سوم سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶)


تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور:

میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و یکم ماه سال جاری 5.1 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 1.3 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری - درصد کمتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 3.6 میلیمتر بوده است و بارش سال جاری 44.1 درصد بیشتر از بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سوم متعلق به ایستگاه علی آباد در استان گلستان به میزان 71.1 میلیمتر بوده است. گرم ترین منطقه آب پخش استان بوشهر به میزان 46.5 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه توچال استان تهران به میزان 1.6 درجه سلسیوس بوده است.


نقشه میانگین بارش بلند مدت کشور از ابتدای سال آبی تا ۱۴۰۵/۰۷/۲۱




نقشه اختلاف مجموع بارش کشور و استانها با بلند مدت از ابتدای فصل جاری تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱



نقشه مجموع بارش کشور از ابتدای سال آبی تا ۱۴۰۵/۰۷/۲۱



نقشه اختلاف بارش تجمعی با بلند مدت از ابتدای سال آبی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱



پیش بینی وضع هوا (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ لغایت ۱۴۰۵/۰۷/۲۹)

روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۲۲: رگبار باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در آذربایجان غربی، مازندران، ارتفاعات سمنان، نیمه شمالی فارس، کرمان، اصفهان، یزد، کهگیلویه و بویر احمد **روز پنج شنبه ۱۴۰۵/۰۷/۲۳:** رگبار باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در آذربایجان غربی، فارس، شرق بوشهر، شمال هرمزگان، جنوب یزد، کهگیلویه و بویر احمد **صبح پنج شنبه:** افزایش ۲ تا ۴ درجه دما شمال غرب کشور **روز جمعه ۱۴۰۵/۰۷/۲۴:** رگبار باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویر احمد، شمال و شرق هرمزگان، جنوب کرمان **صبح جمعه:** تغییرات دمایی قابل ملاحظه پیش بینی نمی شود **روز شنبه ۱۴۰۵/۰۷/۲۵:** رگبار باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، کهگیلویه و بویر احمد، شمال فارس **صبح شنبه:** تغییرات دمایی قابل ملاحظه پیش بینی نمی شود **روز یکشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۲۶:** رگبار باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در مازندران، سمنان، همدان، کهگیلویه و بویر احمد، نیمه غربی اصفهان، نیمه شرقی فارس، شمال و شرق هرمزگان، جنوب کرمان **صبح یکشنبه:** کاهش ۳ تا ۵ درجه دما در نیمه غربی کشور **روز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۲۷:** رگبار باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در اردبیل، گیلان، مازندران، شمال سمنان، شمال ایلام، اصفهان، یزد، کرمان، شرق فارس، شمال و شرق هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان **صبح دوشنبه:** کاهش ۳ تا ۵ درجه دما در نواحی مرکزی و نیمه شمالی کشور **روز سه شنبه ۱۴۰۵/۰۷/۲۸:** رگبار باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شرق و شمال سمنان، کردستان، ایلام، لرستان، شمال خوزستان، همدان، مرکزی، زنجان، قزوین، البرز، شمال تهران، غرب اصفهان، جنوب کرمان، شمال هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان.

جدول وضعیت رشد محصولات در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی طی هفته گذشته

نام ایستگاه	نام محصول	وارثه	مرحله فنولوژی	آفات و بیماریها	میانگین دمای خاک (درجه سلسیوس)						مجموع واحد حرارتی (درجه روز)				رطوبت خاک %					
					۵	۱۰	۲۰	۳۰	۵۰	۱۰۰	۰	۵	۱۰	۱۵	۵	۱۰	۲۰	۳۰	۵۰	۱۰۰
اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اکباتان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اولتان مغان	سویا	L-17	رسیدن دانه	-	۲۱.۶	۲۱.۴	۲۱.۵	۲۱.۸	۲۳.۴	۲۴.۱	۱۳۸.۹	۱۰۳.۹	۶۸.۹	۳۳.۹	-	-	-	-	-	-
اهواز	نخل	برخی	رسیدن میوه	-	۲۴.۱	۲۳.۵	۲۳.۴	۲۳.۵	۲۳.۶	۲۳.۵	۲۲۵.۴	۱۹۰.۴	۱۵۵.۴	۱۲۰.۴	۱۷	۱۸.۱	۱۹	۲۰.۱	۲۱.۳	۲۱.۵
آمل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
برازجان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
چهرم	پرتقال	واشگتن ناول	رشد میوه	-	۳۰.۳	۳۱.۷	۳۱.۲	۳۱.۲	۳۲.۳	۳۲.۱	۱۷۹.۱	۱۴۴.۱	۱۰۹.۱	۷۴.۱	۲۳.۵	۳۰.۳	۳۲	۳۴.۶	۳۵.۷	۳۰.۹
چهرم	خرما	شاهانی	خرما	-	۳۰.۳	۳۱.۷	۳۱.۲	۳۱.۲	۳۲.۳	۳۲.۱	۱۷۹.۱	۱۴۴.۱	۱۰۹.۱	۷۴.۱	۲۳.۵	۳۰.۳	۳۲	۳۴.۶	۳۵.۷	۳۰.۹
حاجی آباد	پرتقال	محلی	رشد میوه	-	۳۳	۳۲.۲	۳۱.۸	۳۱.۹	۳۲	۳۱.۴	۱۹۵.۸	۱۶۰.۸	۱۲۵.۸	۹۰.۸	۱۹.۸	۲۰.۲	۲۰.۶	۲۰.۱	۱۹.۴	۱۹
خسرو شاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داراب	پرتقال	واشگتن ناول	رسیدن میوه	-	۳۳.۲	۳۲.۶	۳۲.۳	۳۲.۱	۳۳.۶	۳۲.۷	۱۹۹.۵	۱۶۴.۵	۱۲۹.۵	۹۴.۵	۲۸	۲۶.۴	۲۵.۲	۲۹	۳۳.۲	-
داراب	ذرت	۷۰۳	گلدهی	-	۳۳.۲	۳۲.۶	۳۲.۳	۳۲.۱	۳۳.۶	۳۲.۷	۱۹۹.۵	۱۶۴.۵	۱۲۹.۵	۹۴.۵	۳۰	۳۱.۲	۲۴.۸	-	-	-
دانشگاه زنجان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دانشگاه ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دهلران	کلزا	پیشرو	کاشت	-	۳۵.۷	۳۶.۱	۳۵.۷	۳۶	۳۶.۲	۳۶.۸	۲۴۱.۴	۲۰۶.۴	۱۷۱.۴	۱۳۶.۴	-	-	-	-	-	-
رشت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رفسنجان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زرقان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زهک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سامان	بادام	شاهرود ۱۰	رشد میوه	-	۲۳.۶	۲۱.۹	۲۱.۳	۲۱.۶	۲۱.۹	۲۱.۹	۱۴۰	۱۰۵	۷۰	۳۵	۴.۸	۷.۹	۱۰.۳	۱۳.۸	۱۴.۳	۱۶
سرآرود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیلاخور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صفی آباد	ذرت	Sc703	ظهور گل آذین‌تر	-	۳۵.۴	۳۴.۴	۳۳.۷	۳۳.۸	۳۳.۷	۳۳.۳	۲۲۱.۸	۱۸۶.۸	۱۵۱.۸	۱۱۶.۸	۱۵.۶	۱۸.۱	۱۹.۳	۲۰.۵	۱۸.۵	۲۳.۷
فرخ شهر	سیب زمینی	بامبو	نمو قسمت های قابل برداشت	-	۲۳	۲۱.۹	۲۱	۲۱.۲	۲۱.۴	۲۱.۵	۱۲۴.۷	۸۹.۷	۵۴.۷	۱۹.۷	۱۰	۱۵	۱۹	۲۱	۲۳	-
قراخیل	پرتقال	تامسون	رشد میوه	-	۲۳.۶	۲۳.۳	۲۳.۴	۲۳.۷	۲۳.۶	۲۳	۱۶۰.۸	۱۲۵.۸	۹۰.۸	۵۵.۸	۲۳	۱۹	۳۰	۴۱	۴۴	۴۷
کبوتر آباد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کرج	ذرت	BK66	نمو دانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گلمکان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گنبد کاووس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
میاندوآب	آلو	شابلون	رشد شاخ و برگ	-	۲۰.۶	۱۸.۵	۱۸.۶	۱۸.۶	۲۱.۹	۲۱.۸	۱۱۵	۸۰	۴۵	۱۰	۲۲	۲۳.۱	۲۳.۸	۲۵.۲	۲۶	۲۷.۸
میاندو جیرفت	پرتقال	والنسیا	رشد میوه	-	۳۹.۶	۳۹	۳۸.۴	۳۸.۲	۳۸	۳۸.۴	۲۲۱.۹	۱۸۶.۹	۱۵۱.۹	۱۱۶.۹	۱۲	۱۱	۱۱	۱۰	۹	۸
میاندو جیرفت	سیب زمینی	ساتنه	جوانه زنی	-	۳۹.۶	۳۹	۳۸.۴	۳۸.۲	۳۸	۳۸.۴	۲۲۱.۹	۱۸۶.۹	۱۵۱.۹	۱۱۶.۹	۱۲	۱۱	۱۱	۱۰	۹	۸
میناب	انبه	لانگرا	ظهور جوانه های رویش	-	۴۰	۳۹.۷	۳۹.۲	۳۹.۱	۳۹.۴	۳۹.۴	۲۲۵.۵	۱۹۰.۵	۱۵۵.۵	۱۲۰.۵	۱۲	۱۴	۱۵	۱۳	۱۲	۱۱
میناب	کنار	دوکی	ظهور جوانه های رویش	-	۴۰	۳۹.۷	۳۹.۲	۳۹.۱	۳۹.۴	۳۹.۴	۲۲۵.۵	۱۹۰.۵	۱۵۵.۵	۱۲۰.۵	۱۲	۱۴	۱۵	۱۳	۱۲	۱۱
نجف آباد	بادام	شاهرود ۱۲	کامل شدن رشد شانه	-	۲۸.۳	۲۸.۱	۲۷.۸	۲۷.۵	۲۸.۳	۲۸.۵	۱۶۲.۵	۱۲۷.۵	۹۲.۵	۵۷.۵	۱	۱	۲	۳	۳	۵
نجف آباد	انگور	عسگری	پایان رسیدن چوب	-	۲۸.۳	۲۸.۱	۲۷.۸	۲۷.۵	۲۸.۳	۲۸.۵	۱۶۲.۵	۱۲۷.۵	۹۲.۵	۵۷.۵	۱	۲	۳	۳	۶	۷
نجف آباد	انار	ملس دانه قرمز	نمو میوه	-	۲۸.۳	۲۸.۱	۲۷.۸	۲۷.۵	۲۸.۳	۲۸.۵	۱۶۲.۵	۱۲۷.۵	۹۲.۵	۵۷.۵	۱	۲	۳	۳	۵	۷
نیشابور	زعفران	تربت حیدریه	پیری و خواب	-	۲۴.۷	۲۴.۶	۲۴.۴	۲۴.۸	۲۵.۲	۲۵.۸	۱۳۳.۵	۹۸.۵	۶۳.۵	۲۸.۵	۵.۷	۶.۲	۶	۸	۸.۲	۷
هاشم آباد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

توصیه های هواشناسی کشاورزی (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ لغایت ۱۴۰۵/۰۷/۲۶)

استان آذربایجان شرقی :

- برداشت به موقع محصولات و انتقال آن به مکان های مسقف به علت بارش های رگباری در این فصل
- کاشت محصولات پائیزه
- عدم دپوی محصولات برداشته شده به علت بارش های احتمالی
- تنظیم رطوبت، دما و تهویه دآمداری ها جهت حفاظت از دامها و جلوگیری از شیوع بیماری ها
- جمع آوری میوه های ریخته شده کف باغات در راستای کاهش جمعیت آفات و بیماری ها
- سمپاشی قبل از کشت و مخلوط خاک و علف کش در مزارع کلزا
- بوجاری و ضد عفونی بذور خود مصرفی قبل از کاشت
- رعایت اصول بهداشتی در برداشت میوه و انبارداری آنها

استان آذربایجان غربی :

- تعجیل در برداشت محصولات باغی خصوصا سیب بخاطر شرایط جوی
- محلول پاشی با فروت ست بعد از برداشت محصول تا ریزش برگ ها
- برداشت اصولی محصولات و انتقال سریع به سردخانه و جلوگیری از دپوی محصول در کنار جاده
- تنظیم دما و رطوبت در گلخانه ها و بازدید از تجهیزات گلخانه ای جهت جلوگیری از خسارت
- جابجایی کلنی های زنبور عسل به مناطق ایمن
- استحکام بخشی بدنه کندوها برای جلوگیری از رطوبت و باران
- استفاده از تهویه مناسب با شرایط اقلیمی

استان اردبیل :

- مدیریت دما و رطوبت گلخانه ها، دآمداری ها، مرغداری ها، سردخانه ها و واحدهای تولیدی ؛
- تسریع در انتقال محصولات برداشت شده به مکان های مسقف؛
- انجام بهداشت و پاکسازی باغات؛
- آماده سازی مزارع جهت انجام کشت پاییزه،
- مدیریت زهکشی مزارع و باغات در زمان بارندگی جهت جلوگیری از ماندابی؛
- بررسی استحکام سازه های گلخانه ای و حفاظت از ادوات کشاورزی در برابر باد شدید؛
- پایش باغات و مزارع از لحاظ آفات و بیماری و انجام اقدامات لازم با مشاوره کارشناسان جهاد کشاورزی؛

استان اصفهان :

- تهیه بستر کشت و تهیه نهاده های کشاورزی از جمله کود و بذور در مناطق سردسیر استان
- کشت دیم در مناطق سردسیر استان
- تمهیدات لازم جهت استحکام سازه های گلخانه و سایر اقدامات لازم با توجه به احتمال وزش بادهای شدید در بعد از ظهرها
- آماده سازی مزارع دیم نخود جهت کشت

استان البرز :

- قطع کامل آبیاری مزارع پنبه جهت ایجاد تعادل هورمونی برای باز شدن قوزه ها .
- استفاده از کودهای «پتاسه» در مزارع ذرت برای بهبود کیفیت دانه و همچنین جلوگیری از نوسانات دمایی.
- در مزارع سبزی و صیفی تمهیدات لازم (از قبیل سیل بند و ...) برای جلوگیری از خسارات احتمالی در اثر پدیده «ال نینو» داشته باشند.
- در باغات به عنوان آخرین اقدام پس از برداشت محصول، اقدام به محلول پاشی با استفاده از « نیترات کلسیم» و «فروت ست» نمایند.

استان ایلام :

- نسبت به پایش مستمر مزارع و محصولات در حال برداشت اقدام و برداشت محصولات رسیده، به ویژه سبزی و صیفی و محصولات جالیزی، در ساعات خنک روز انجام شود
- برنامه آبیاری مزارع و باغات بر اساس نیاز آبی محصول، مرحله رشد و رطوبت خاک تنظیم شده و از ایجاد تنش آبی در محصولات در حال رشد جلوگیری شود
- با توجه به کاهش دما از روز سه شنبه، در صورت نیاز به انجام سم پاشی و محلول پاشی، عملیات به زمان مناسب از نظر دما و سرعت باد موکول شده و در ساعات وزش باد و شرایط غبار آلود انجام نشود
- در نواحی مرزی و مناطق مستعد وزش باد، از انجام عملیات خاک ورزی غیر ضروری خودداری و با حفظ بقایای گیاهی و پوشش سطح خاک، نسبت به کاهش فرسایش بادی و حفظ رطوبت خاک اقدام شود.
- در زمان وزش باد نسبتاً شدید، از سم پاشی و محلول پاشی خودداری و سرعت باد قبل از عملیات سم پاشی بررسی شود تا از کاهش اثربخشی سم و پراکنش آن به اراضی مجاور جلوگیری گردد
- ایمن سازی کانال های ورودی استخرها

استان بوشهر :

- با توجه به وزش باد طی ساعاتی از روز و تداوم گرمی هوا و رطوبت، توجه به میزان رطوبت سطح خاک و آبیاری نخیلات و مرکبات.
- مجاز به هر گونه سمپاشی و محلول پاشی (طی صبح و بعدازظهرها) در روزهای آتی در باغات مرکبات و نخیلات.
- تغذیه متناسب و استفاده از قارچکش های محافظتی برای درختان در باغات مرکبات و نخیلات.
- در پی وزش باد طی ساعاتی از روز و تداوم گرمی هوا و شرجی، توجه به رطوبت و تهویه مطبوع محیط گلخانه ها.
- پایش و کانون کوبی سفیدک برگی در محصولات جالیزی و مصرف انواع قارچکش های محافظتی در محصولات گلخانه ای.
- در صورت روئیت و ازدیاد پروانه مینوز، مصرف انواع آفت کش ها و سم پاشی محصولات گلخانه ای.

استان تهران :

- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد در عصر هنگام
- باغداران عزیز قبل از خزان کامل درختان، سرشاخه های خشک ناشی از آفات و بیماریها را هرس نموده و خارج از محیط باغ بسوزانند
- با شروع زمان برداشت انار، بمنظور کاهش جمعیت آفت هایی از قبیل کرم گلوگاه انار و سوسک های میوه خوار ، باید در زمان برداشت همه میوه های مرغوب و نامرغوب ، برداشت و انار های آفت زده و آلوده در سایه انداز درختان انار در عمق سی سانتیمتری مدفون گردد.
- آماده سازی اراضی جهت کشت پاییزه غلات و با توجه به مناسب بودن دما عملیات کشت کلزا در مزارع آغاز شود

استان چهارمحال بختیاری :

- مدیریت و تنظیم دور و میزان آبیاری مزارع و باغات (کاهش یا قطع آبیاری) با توجه به نیاز محصولات و آغاز فصل بارندگی و سرما.
- تسریع در برداشت محصولات بهاره (لوبیا، ذرت، سیب زمینی و ...) جهت جلوگیری از خسارت تنش سرمازدگی و بارندگی احتمالی طی روزهای آینده.
- آماده سازی بستر زمین و بذر جهت انجام کشت محصولات پائیزه با توجه به آغاز زود هنگام و فراتر از نرمال بارش های پائیزه از نیمه دوم مهرماه.
- پاک سازی و لایروبی کانال ها و مسیرهای انتقال آب مزارع و باغات با توجه به شروع بارش های پائیزه.

- تسریع در جمع آوری محصولات برداشت شده و کاه و کلش دپو شده در حاشیه مزارع و انتقال به اماکن مسقف با توجه به احتمال بارندگی و وزش باد طی روزهای آینده (به ویژه در مناطق شرقی و شمالی استان).
- استقرار کندوها در مناطق بالادست و دور از حاشیه مسیل ها با توجه به احتمال رخداد بارش های رگباری و ایجاد روان آب در روزهای آینده.
- تسریع در کوددهی درختان میوه با محلول فروت ست جهت تقویت و افزایش مقاومت درختان به تنش های محیطی، بلافاصله پس از برداشت محصول و پیش از ریزش برگ ها.
- تنظیم و کنترل دما، رطوبت و تهویه گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به روند کاهشی دما و رخداد بارندگی طی روزهای آینده.

استان خراسان جنوبی :

- مزارع زعفران برای ورود به فصل آبیاری آماده سازی شوند.
- محلول پاشی و سم پاشی در ساعات آرام جوی بلامانع می باشد.
- تنظیم دما و تهویه مناسب در سالن های پرورشی انجام پذیرد.
- استحکام پوشش و سازه گلخانه ها مورد بررسی قرار بگیرد.
- تسریع در برداشت محصولات حساس به دماهای زیر ۵ درجه و تنظیم دمای گلخانه ها، سالن های پرورشی، مرغداری و ... توصیه می شود

استان خراسان رضوی :

- خود داری از تخریب و بوته کنی و نیز عدم آتش زدن مراتع.
- تنظیم دما و رطوبت مرغداری ها و مراکز پرورش قارچ
- سرویس ادوات برداشت و اطمینان از عدم آلودگی ادوات و ایجاد تمهیدات جهت حداقل ریزش.
- تنظیم دور آبیاری کولتیوار زدن مزارع زعفران

استان خراسان شمالی :

- انتقال محصولات برداشت شده به انبارهای مسقف و استاندارد
- در صورت نیاز تسریع در ترمیم اماکن نگه داری دام و طیور و تنظیم دما و شرایط محیطی

استان خوزستان :

- تعمیر و ترمیم و لایروبی زهکشا و کانالهای آبرسانی
- بیمه محصولات کشاورزی با توجه به هشدارهای هواشناسی و احتمال مخاطرات جوی
- پایش مستمر آفات و بیماریهای محصولات (بلاست و کرم ساقه خوار و برگخوار پاییزه)
- تقسیط کودهای ازته و خودداری از مصرف بیش از حد آن در شالیزارها
- سرویس تجهیزات گرمایی و حرارتی با توجه به نزدیک شدن به فصل پاییز
- ادامه برداشت رطب و خرما
- محلول پاشی فروت ست یا میکرو کامل در باغات برداشت شده
- ادامه کشت محصولات جالیری و صیفی جات پاییزه
- پایش مستمر آفات و بیماریهای نخیلات با توجه به شرایط محیطی مناسب شیوع بیماریها
- ایمن سازی و مقاوم سازی گلخانه ها با توجه به احتمال بارش های شدید طی فصل زراعی پیش رو

استان زنجان :

- خودداری از کشت در اراضی شیب دار، اراضی مسیر رودخانه ها و اراضی ماندابی
- خودداری از دپو محصولات برداشت شده در مزارع
- احتیاط عشایر و دامداران در عبور از ارتفاعات و حاشیه مسیل ها و رودخانه ها
- احتیاط در سم پاشی و محلول پاشی
- بسته نگه داشتن دریچه های گلخانه ها

- تنظیم دمای سالن‌های پرورش طیور قبل از جوجه ریزی و مطمئن از گرم شدن سالن‌ها مخصوصاً کف آنها

استان سمنان :

- انجام کشت پاییزه غلات با بذور ضدعفونی شده
- احتیاط در چرای دامها در ارتفاعات خصوصاً در بعدازظهرها به دلیل خطرات سیلاب و برق زدگی
- انجام محلول پاشی تغذیه ای باغات پس از برداشت و قبل از خزان برگها
- تنظیم نور و دمای شبانه گلخانه ها و کنترل سطوح پوششی ودریچه سالنها
- کنترل استحکام سازه ها و مهار سیستم های آبیاری بارانی و استفاده قییم برای نهالهای جوان

استان سیستان و بلوچستان :

- تسریع در برداشت انار و دیگر محصولات باغی و زراعی استان
- تسریع در تامین نهاده ها، کود ها ، و آماده سازی بستر جهت کشت الگویی
- بیمه نمودن محصولات کشاورزی در سریع ترین زمان ممکن، به منظور کاهش خسارات احتمالی ناشی از حوادث و مخاطرات طبیعی
- تسریع در تامین و ذخیره سوخت در گلخانه ها و سالن های پرورشی و سرویس تجهیزات گرمایشی گلخانه ها
- رعایت مستمر بهداشت باغ و مبارزه با آفات و بیماری ها، آبیاری و محلول پاشی متناسب باغات بعد از برداشت محصول
- ادغام کندوهای ضعیف ، تقویت کندوها و تغذیه مناسب، و مدیریت دقیق در تامین انرژی مورد نیاز کلنی

استان فارس :

- تنظیم دور آبیاری در مزارع و آماده سازی بستر کاشت گندم و جو
- کنترل و جلوگیری از ورود روان آب به باغات و مزارع و انتقال محصولات برداشت شده به انبار و لایروبی و پاکسازی آبراهه ها
- شروع کاشت چغندر قند و کلزا و انتخاب انواع بذر با طول دوره رویش بیشتر (دیررس)
- کاهش تدریجی دور آبیاری در مزارع زودکاشت پنبه و اجتناب از کودهای محرک رشد
- احتیاط در برداشت یونجه و نعنا طی روز چهارشنبه و پنجشنبه و احتیاط در انجام هرگونه عملیات سم پاشی و محلول پاشی
- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و خودداری از چرای دام در ارتفاعات و حاشیه رودخانه ها
- عایق بندی، مدیریت تغذیه و انتقال کندوهای زنبور عسل به مناطق غیر آبخیز، دور از حاشیه رودخانه ها

استان قزوین :

- ادامه کشت کلزا
- ادامه کشت غلات
- شخم بعد از برداشت مزارع ذرت برای از بین بردن لاروهای برگخوار ذرت برای کشت سال بعد
- تسریع در برداشت محصولات باغی باقی مانده از جمله هلو، شلیل، گلابی درگزی و انار
- جمع آوری کشمش از بارگاهای کشمش

استان قم :

- تسریع در کاشت کلزا.
- تسریع در کشت یونجه پاییزه.
- ضد عفونی بذره‌های خودمصرفی کشاورزان
- دقت در میزان آبیاری در باغات انار و جلوگیری از نوسانات آبیاری به جهت کاهش ترک خوردگی میوه.
- بهترین زمان مبارزه با علف هرز مرغ (چمن) بعد از برداشت محصول پسته میباشد.

- عدم انجام هر گونه سم پاشی شیمیایی در آخر فصل جهت حفظ حشرات مفید در سطح باغات.
- انجام عملیات زخم آب (بعد از برداشت) پسته در باغات.

استان کردستان :

- تسریع در انجام کشت های پاییزه گندم و جو با توجه به پیش بینی بارش های زودرس
- انجام کشت کلزا
- تسریع در برداشت مزارع سبزی و صیفی بویژه سیب زمینی
- جلوگیری از آتش زدن بقایا در مزارع برداشت شده غلات پاییزه
- انجام آزمون خاک به منظور تعیین نیاز تغذیه ای محصول قبل از انجام کاشت

استان کرمان :

- پایش و مراقبت باغات از نظر وقوع خسارت کنه تارتن دولکه ای در ساعات خنک روز.
- تغذیه مناسب و تقویت درختان مثمر با هدف درشت شدن میوه و افزایش ماندگاری میوه روی شاخه های درختان، با استفاده از کودهای پایه NPK (پتاسه،ازنه و فسفره) ، فروت ست و محلول پاشی گوگرد مایع و سولفات پتاسیم (سولوپتاس).
- تامین گرده مناسب از طریق کیک گرده
- آماده سازی جهت کوچ به سمت قشلاق
- استقرار کلنی ها در خلاف باد غالب
- کنترل دریچه های پرواز
- کنترل دمای شبانه مرغداری ها به خصوص در مناطق کوهستانی با توجه به روند کاهشی دما در این فصل از سال.
- تامین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و تهیه خوراک پرانرژی.

استان کرمانشاه :

- برداشت محصولات آماده و جمع آوری بقایای سبک و تجهیزات رها شده در مزرعه در مناطق دارای باد شدید.
- کنترل قیم نهال های جوان و استحکام شاخه های سنگین و سازه های محافظ باغ.
- تنظیم آبیاری باغ ها بر اساس رطوبت خاک و بارندگی مؤثر و خودداری از آبیاری غیر ضروری پیش از بارندگی.
- باز نگه داشتن مسیر خروج آب باران از سقف و اطراف گلخانه.
- تنظیم دما و رطوبت گلخانه متناسب با نیاز محصول به منظور کاهش خطر بیماری های قارچی

استان کهگیلویه و بویراحمد :

- تسریع در جمع آوری محصولات قابل برداشت
- خودداری از چرای دام در مناطق مرتفع و حاشیه مسیل ها و رودخانه ها
- تسریع در جمع آوری محصولات قابل برداشت
- خودداری از روشن کردن آتش و استفاده از مواد آتش زا در مراتع، جنگل ها و مزارع برداشت شده
- خودداری از چرای دام در مناطق مرتفع و حاشیه مسیل ها و رودخانه ها
- آگاهی از تغییرات جوی و اطلاعات هواشناسی قبل از هر گونه عملیات کشاورزی

استان گلستان :

- آماده سازی زمین برای کشت کلزا، بهترین تاریخ کشت کلزا ۱۵ مهر ماه تا ۱۵ آبان
- ترمیم زهکش ها و استفاده از بارش های فصلی برای اصلاح خاک های شور و خاک سدیمی
- برداشت شالی رسیده برای جلوگیری از ورس با توجه به بارش های رگباری پاییز
- برداشت محصول ذرت که به مرحله خمیری دانه رسیده
- تعجیل در برداشت وش پنبه و خودداری از برداشت غوزه های نارس
- نگهداری وش در مکان سر پوشیده و هوادهی روزانه وش در انبار

استان گیلان :

- انجام عملیات خاکورزی و آماده سازی زمین برای کشت گندم و جو و دانه های روغنی
- مدیریت زراعی محصولات کشت دوم (حبوبات، علوفه، سبزیجات)
- کنترل و تهویه دمای گلخانه ها و واحد های قارچ در شرایط نوسانات دمایی
- اجتناب از تراکم بیش از حد گله با توجه به افزایش عوامل بیماریزا و آلودگی
- در اختیار گذاشتن آب تمیز و خنک به میزان کافی در مرغداری ها

استان لرستان :

- عدم کاشت محصولات دیم تا اطلاع ثانویه
- کشت گندم و جو آبی در استان و ضد عفونی بذور غلات قبل از کشت
- مبارزه با علف هرز مزارع کلزا همراه با آبیاری در صورت نیاز
- آبیاری منظم باغات انار جهت جلوگیری از ترکیدگی میوه و تسریع در برداشت انار های زودرس مناطق سرد
- قطع آبیاری باغات میوه در مناطق سرد جهت مقاوم سازی درختان به سرما
- تنظیم دما و تهویه در گلخانه ها و سالنهای پرورش قارچ خوراکی

استان مازندران :

- تأکید بر ضد عفونی بذور گندم، جو، کلزا و کاملینا قبل از کاشت (بوجاری) در زراعت پائیزه
- کشت کلزا و کاملینا در اراضی کشاورزی استان
- کاشت سبزی های برگی (اسفناج، گشنیز، شنبلیله، شوید، جعفری و ...) در اراضی شالیزاری و با رعایت زهکش مناسب
- ادامه برداشت نارنگی های پیش رس (ایواساکی، میاگاوا و ... با در نظر گرفتن میزان قند، قطر و رنگ میوه)
- استفاده از کودهای حاوی اسید آمینه و پتاس بالا بصورت محلول پاشی در درختان پرتقال تامسون
- انجام عملیات طعمه پاشی و کاور اسپری در باغ های مرکبات جهت کاهش جمعیت مگس میوه مدیترانه ای

استان مرکزی :

استان هرمزگان :

- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سمپاشی به دلیل وزش باد
- تسریع در برداشت محصول خرما ی پیارم به دلیل وزش باد و بارش احتمالی عصرگاهی
- خودداری از چرای عصرگاهی دام ها در ارتفاعات و حاشیه رودخانه های فصلی به دلیل رگبار باران و رعد و برق
- اطمینان از استحکام سازه های گلخانه ها به دلیل وزش باد
- تنظیم دما و تهویه هوا و رطوبت در مرغداری ها با توجه به اختلاف دمای شب و روز

استان همدان:

- با توجه به احتمال وقوع بارندگی از ۲۷ مهرماه به بعد و تداوم احتمالی بارندگی ها بعد از این تاریخ، به کشاورزان محترم استان توصیه می شود تا پیش از این تاریخ کشت غلات (گندم و جو آبی و دیم) انجام پذیرد.
- اما تا حد امکان کشت دیرتر و نزدیک تر به تاریخ ۲۷ مهرماه انجام پذیرد
- مدیریت کشت با توجه به وضعیت و مقدار زمین کشاورز متغیر است. در اراضی آبی لطفاً در صورت کشت از انجام آبیاری زود هنگام خودداری گردد.
- در مزارع سیب زمینی با توجه به شرایط آب و هوایی پیش رو و بر اساس پیش بینی های هفتگی هواشناسی اقدام به قطع آبیاری و تنظیم رطوبت خاک به منظور شروع برداشت محصول گردد.

- تنظیم برنامه آبیاری مزارع سیب زمینی و چغندر قند بر اساس پیش بینی هفتگی هواشناسی، به منظور ایجاد شرایط رطوبتی مناسب جهت برداشت محصول و احتمال وقوع بارش های پراکنده در روزهای پیش رو.
- انجام تمهیدات لازم جهت برداشت انگور و تهیه کشمش در فضای باز با توجه به پیش بینی بارندگی های پراکنده در روزهای پیش رو.
- برداشت و جمع آوری محصول یونجه و لوبیا با در نظر گرفتن پیش بینی هفتگی هواشناسی و وقوع احتمالی بارندگی های پراکنده در روزهای پیش رو.
- انجام تمهیدات لازم در خصوص محصولات برداشت شده در فضای باز با توجه به احتمال وقوع بارندگی های پراکنده در روزهای پیش رو.
- ذرت کاران استان با توجه به روند کاهش دمای هوا نسبت به برداشت محصول تا تاریخ ۲۷ مهرماه اقدام نمایند.

استان یزد:

- باتوجه به احتمال بارندگی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته ترمینال دارانی که پسته را میدان افتابی قرار می دهند احتیاطات لازم را رعایت نمایند
- خودداری از آبیاری بیش از ۱ تا ۲ نوبت باغات پسته تا اوایل زمستان
- برای کاهش رطوبت نسبی در گلخانه و مقابله با بروز و طغیان بیماری قارچی و خطرناک سرخک از هنگام غروب دریچه های ناودانی گلخانه ها به اندازه ۴ تا ۵ سانتیمتر باز گذاشته شود
- کاهش دمای هوا احتمال سرمازدگی مزارع ذرت را افزایش می دهد. ذرت کاران با روش های ممکن (مثل آبیاری) از مزرعه محافظت نمایند
- بهترین زمان کشت گندم اول آبان تا ۱۵ آبان و کلزا اوایل مهر تا اواخر مهر و جو اواسط آبان تا اواخر آذر می باشد
- از بردن دامهای سبک به ارتفاعات در روز ها و ساعات با وزش باد خودداری گردد
- هیچگونه شعله افکنی در واحد های دامداری در ساعات با وزش باد صورت نگیرد
- با توجه به دماهای کمینه دامهای تازه متولد شده شب در محیط سربسته نگهداری شوند
- با توجه به تداوم هوای گرم در ساعات میانی روز، توصیه می شود برداشت، درجه بندی و جابه جایی ماهیان در ساعات خنک تر انجام شود تا از بروز تنش ناشی در ماهیان جلوگیری شود.