

شهریور ماه
شماره پنجاه و یکم
۱۴۰۴-۱۴۰۵

بولتن هفتگی هواشناسی کشاورزی



اداره ایستگاه های هواشناسی کشاورزی

بسمه تعالی


وزارت راه و شهر سازی
سازمان هواشناسی کشور
اداره کل شبکه دیدبانی

خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی (هفته پنجاه و یکم سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴)


تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور:

میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و سوم شهریور ماه سال جاری 233.9 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 135.4 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 72.8 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 232.4 میلیمتر بوده است و بارش سال جاری 0.7 درصد بیشتر از بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته پنجاه و یکم متعلق به منطقه ی رودسر استان گیلان به میزان 169.1 میلیمتر بوده است. گرم ترین منطقه آب پخش استان بوشهر به میزان 49.7 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه توجال استان تهران به میزان 4.3 درجه سلسیوس بوده است.


نقشه میانگین بارش بلند مدت کشور از ابتدای سال آبی تا ۱۴۰۵/۰۶/۲۳




نقشه اختلاف مجموع بارش کشور و استانها با بلند مدت از ابتدای فصل جاری تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳



نقشه مجموع بارش کشور از ابتدای سال آبی تا ۱۴۰۵/۰۶/۲۳



نقشه اختلاف بارش تجمعی با بلند مدت از ابتدای سال آبی تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳



پیش بینی وضع هوا (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ لغایت ۱۴۰۵/۰۶/۳۱)

روز سه شنبه ۱۴۰۵/۰۶/۲۴: رگبار پراکنده باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، شرق خراسان جنوبی، ارتفاعات استانهای سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شمال و شرق هرمزگان **روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۲۵:** رگبار پراکنده باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در ارتفاعات استانهای جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شمال و شرق هرمزگان **صبح چهارشنبه:** کاهش ۳ تا ۵ درجه دما در شرق کشور **روز پنج شنبه ۱۴۰۵/۰۶/۲۶:** رگبار پراکنده باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در ارتفاعات استانهای مازندران، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شمال و شرق هرمزگان **صبح پنج شنبه:** کاهش ۳ تا ۵ درجه دما در جنوب شرق کشور **روز جمعه ۱۴۰۵/۰۶/۲۷:** رگبار پراکنده باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در ارتفاعات استانهای مازندران، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شمال و شرق هرمزگان **صبح جمعه:** افزایش ۳ تا ۵ درجه دما در نیمه غربی کشور **روز شنبه ۱۴۰۵/۰۶/۲۸:** رگبار باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، شمال اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات استانهای جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان، جنوب کرمان **صبح شنبه:** افزایش ۳ تا ۵ درجه دما در نیمه شرقی کشور و کاهش ۳ تا ۵ درجه دما در نیمه غربی کشور **روز یکشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۲۹:** رگبار باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در شمال آذربایجان شرقی، شمال اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال سمنان، و ارتفاعات استانهای جنوب سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان، جنوب کرمان **یکشنبه:** کاهش حدود ۳ تا ۵ درجه دما در نیمه غربی و شمالی کشور **روز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۶/۳۰:** رگبار پراکنده باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد موقتی در ارتفاعات استانهای مازندران، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شمال و شرق هرمزگان **روز سه شنبه ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:** رگبار پراکنده باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد موقتی در ارتفاعات استانهای مازندران، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شمال و شرق هرمزگان

جدول وضعیت رشد محصولات در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی طی هفته گذشته

نام ایستگاه	نام محصول	وارتیه	مرحله فنولوژی	آفات و بیماریها	میانگین دمای خاک (درجه سلسیوس)						مجموع واحد حرارتی (درجه روز)				رطوبت خاک %					
					۵	۱۰	۲۰	۳۰	۵۰	۱۰۰	۰	۵	۱۰	۱۵	۵	۱۰	۲۰	۳۰	۵۰	۱۰۰
اردبیل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اکباتان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اولتان مغان	سویا	L-17	نمو دانه	-	۲۵.۷	۲۵.۴	۲۶.۳	۲۶.۱	۲۷.۳	۲۷	۱۵۳.۲	۱۱۸.۲	۸۳.۲	۴۸.۲	۱۷.۴	۱۸.۸	۱۹.۱	۱۸.۱	۱۶.۹	-
اهواز	نخل	برخی	رطب	-	۲۸.۱	۳۷	۳۶.۲	۳۶.۲	۳۶.۱	۳۴.۸	۲۴۷.۱	۲۱۲.۱	۱۷۷.۱	۱۴۲.۱	۱۷	۱۸.۱	۱۹.۲	۲۰.۲	۲۱.۳	۲۱.۶
آمل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
برازجان	خرما	کیکاب	خرما	-	۴۵.۴	۴۴.۱	۴۳.۶	۴۲.۸	۴۲.۶	۴۳.۲	۲۶۰.۲	۲۲۵.۲	۱۹۰.۲	۱۵۵.۲	-	-	-	-	-	-
چهرم	پرتقال	واشگتن ناول	نمو میوه	-	۳۷.۶	۳۸.۷	۳۶.۶	۳۴.۹	۳۶.۷	۳۴.۳	۲۰۴	۱۶۹	۱۳۴	۹۹	۱۹.۶	۲۵.۱	۲۴.۲	۲۹.۵	۲۷.۱	۲۰.۵
چهرم	خرما	شاهانی	رطب	-	۳۷.۶	۳۸.۷	۳۶.۶	۳۴.۹	۳۶.۷	۳۴.۳	۲۰۴	۱۶۹	۱۳۴	۹۹	۱۹.۶	۲۵.۱	۲۴.۲	۲۹.۵	۲۷.۱	۲۰.۵
حاجی آباد	پرتقال	محلی	رشد میوه	-	۴۲.۶	۳۹.۷	۳۷.۵	۳۶.۸	۳۵.۲	۳۳.۱	۲۲۵.۴	۱۹۰.۴	۱۵۵.۴	۱۲۰.۴	۱۹.۸	۲۰.۲	۲۰.۶	۲۰.۱	۱۹.۴	۱۹
خسرو شاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داراب	پرتقال	واشگتن ناول	نمو میوه	-	۳۷.۲	۳۶.۳	۳۵.۸	۳۵.۳	۳۶.۷	۳۴.۳	۲۱۴.۱	۱۷۹.۱	۱۴۴.۱	۱۰۹.۱	۲۰.۴	۱۹	۱۶.۸	۱۹	۱۸	-
داراب	ذرت	۷۰۳	طول شدن ساقه	-	۳۷.۲	۳۶.۳	۳۵.۸	۳۵.۳	۳۶.۷	۳۴.۳	۲۱۴.۱	۱۷۹.۱	۱۴۴.۱	۱۰۹.۱	-	-	-	-	-	-
دانشگاه زنجان	گلرنگ	امیر	پیری و برداشت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دانشگاه ارومیه	سیب	گلدن	برداشت	-	۲۹.۴	۳۱.۹	۳۱.۵	۳۱.۴	۳۲	۲۸.۶	۱۵۷	۱۲۲	۸۷	۵۲	۱۶	۱۴.۸	۱۷.۳	۱۸.۸	۲۲.۴	۲۶.۸
دهلران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
رشت	برنج	هاشمی	برداشت	-	۲۴	۲۲.۹	۲۶.۴	۲۵.۷	۲۳.۹	۲۵.۶	۱۶۲.۷	۱۲۷.۷	۹۲.۷	۵۷.۷	-	-	-	-	-	-
رفسنجان	پسته	فندق	رسیدگی	-	۳۶.۸	۳۶.۸	۳۵.۲	۳۴.۴	۳۴	۳۲.۹	۲۰۳.۳	۱۶۸.۳	۱۲۳.۳	۹۸.۳	-	-	-	-	-	-
زرقان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زهک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سامان	بادام	شاهرود ۱۰	رشد میوه	-	۳۰.۲	۲۷.۸	۲۶.۵	۲۵.۵	۲۵.۱	۲۳.۸	۱۶۰.۱	۱۲۵.۱	۹۰.۱	۵۵.۱	۴.۷	۷.۹	۱۰.۱	۱۴.۱	۱۴.۳	۱۶
سرآرود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیلاخور	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صفی آباد	ذرت	Sc703	برگ دهی	-	۴۰.۵	۳۸.۲	۳۶.۹	۳۶.۹	۳۶.۵	۳۵.۵	۲۳۸	۲۰۳	۱۶۸	۱۳۳	۱۳.۴	۱۹.۱	۱۹	۱۹.۴	۲۰.۶	۱۳.۴
فرخ شهر	سیب زمینی	بامبو	نوسخت های رویشی	-	۲۸.۹	۲۷.۱	۲۵.۶	۲۵.۲	۲۴.۸	۲۳.۶	۱۴۳.۳	۱۰۸.۳	۷۳.۳	۳۸.۳	۱۴	۲۰	۲۵	۲۳	۳۶	-
قراخیل	پرتقال	تامسون	رشد میوه	-	۲۵	۲۴.۴	۲۴.۲	۲۳.۴	۲۳.۱	۲۴	۱۷۰.۷	۱۳۵.۷	۱۰۰.۷	۶۵.۷	۲۴	۲۶	۲۲	۲۲	۴۵	۴۸
کبوترآباد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کرج	ذرت	BK66	نمو دانه	-	۲۵.۳	۲۵.۴	۲۶.۶	۲۷.۱	۲۸.۲	۲۷.۸	۱۶۶.۵	۱۳۱.۵	۹۶.۵	۶۱.۵	-	-	-	-	-	-
گلمکان	انگور	کشمی	نمو میوه	-	۲۶.۷	۲۶.۲	۲۵.۹	۲۵.۸	۲۶.۲	۲۶.۵	۱۵۶.۷	۱۲۱.۷	۸۶.۷	۵۱.۷	۵	۵.۸	۷.۸	۱۰	۱۱.۲	۱۱.۸
گلمکان	آلو	بخارا	نمو میوه	-	۲۶.۷	۲۶.۲	۲۵.۹	۲۵.۸	۲۶.۲	۲۶.۵	۱۵۶.۷	۱۲۱.۷	۸۶.۷	۵۱.۷	۵.۲	۶.۱	۷.۹	۱۰	۱۱.۴	۱۱.۷
گنبد کاووس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
میاندوآب	آلو	شابلون	رشد شاخ و برگ	-	۲۹.۶	۲۵	۲۴.۹	۲۳.۹	۲۶.۲	۲۵.۱	۱۴۱	۱۰۶	۷۱	۳۶	۱۸.۵	۱۹.۲	۲۲.۳	۲۲.۱	۲۴.۱	۲۵.۷
میاندوآب	چغندر	دورتن	نمو غده	-	۲۹.۶	۲۵	۲۴.۹	۲۳.۹	۲۶.۲	۲۵.۱	۱۴۱	۱۰۶	۷۱	۳۶	۱۷.۵	۱۸.۳	۲۱.۸	۲۲.۹	۲۳.۸	۲۵.۳
میاندو جیرفت	پرتقال	والنسپا	نمو میوه	-	۴۴.۴	۴۲.۲	۴۱.۴	۴۱	۴۰.۲	۳۹.۸	۲۵۳.۴	۲۱۸.۴	۱۸۳.۴	۱۴۸.۴	-	-	-	-	-	-
میاندو جیرفت	خرما	مضافتی	برداشت	-	۴۴.۴	۴۲.۲	۴۱.۴	۴۱	۴۰.۲	۳۹.۸	۲۵۳.۴	۲۱۸.۴	۱۸۳.۴	۱۴۸.۴	۱۳	۱۲	۱۲	۱۱	۱۱	۱۰
میناب	کنار	دوکی	ظهور جوان های رویشی	-	۴۴.۶	۴۳.۸	۴۲	۴۱.۶	۴۱.۶	۳۹.۴	۲۴۲.۲	۲۰۷.۲	۱۷۲.۲	۱۲۷.۲	۱۳	۱۴	۱۴	۱۳	۱۲	۱۰
نجف آباد	بادام	شاهرود ۱۲	کامل شدن رشد شاخه	-	۳۴.۷	۳۴	۳۳.۲	۳۲.۶	۳۲.۳	۳۱.۵	۱۸۹.۵	۱۵۴.۵	۱۱۹.۵	۸۴.۵	۲	۳	۴	۵	۵	۷
نجف آباد	انگور	عسگری	بازن رسیدن چوب	-	۳۴.۷	۳۴	۳۳.۲	۳۲.۶	۳۲.۳	۳۱.۵	۱۸۹.۵	۱۵۴.۵	۱۱۹.۵	۸۴.۵	۲۲	۳۰	۲۶	۲۴	۲۰	۱۶
نجف آباد	انار	ملس دانه قرمز	نمو میوه	-	۳۴.۷	۳۴	۳۳.۲	۳۲.۶	۳۲.۳	۳۱.۵	۱۸۹.۵	۱۵۴.۵	۱۱۹.۵	۸۴.۵	۵	۶	۸	۹	۱۱	۱۱
نیشابور	ذرت	۷۰۴	رسیدن دانه	-	۳۰.۶	۲۹.۶	۲۸.۵	۲۸.۲	۲۸.۶	۲۸.۵	۱۷۶.۲	۱۳۹.۶	۱۰۴.۲	۶۹.۸	۲۴.۵	۲۳.۷	۲۳.۳	۲۳.۱	۲۱.۷	۱۴
هاشم آباد	پنبه	خرداد	رسیدن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

توصیه های هواشناسی کشاورزی (از تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ لغایت ۱۴۰۵/۰۶/۲۵)

استان آذربایجان شرقی :

- آماده سازی زمین جهت کاشت محصولات پائیزه
- برداشت به موقع محصولات و انتقال آن به مکان های مسقف به علت بارش های رگباری در این فصل
- تنظیم رطوبت، دما و تهویه دامداری ها جهت حفاظت از دامها و جلوگیری از شیوع بیماری ها
- سمپاشی قبل از کشت و مخلوط خاک و غلف کش در مزارع کلزا
- بوجاری و ضد عفونی بذور خود مصرفی قبل از کاشت
- جمع آوری میوه های ریخته شده کف باغات در راستای کاهش جمعیت آفات و بیماری ها

استان آذربایجان غربی :

- استفاده از سایبان عدم استفاده از آب سرد بدلیل آبستنی دام ها
- تعجیل در برداشت محصولات باغی خصوصا سیب بخاطر شرایط جوی
- محلول پاشی با فروت ست بعد از برداشت محصول تا ریزش برگ ها
- تنظیم آبیاری و خودداری از آبیاری بیش از حد
- برداشت اصولی محصولات و انتقال سریع به سردخانه و جلوگیری از دپوی محصول در کنار جاده
- خودداری از تحریک رشد درختان میوه (با آبیاری زیاد-دادن کود اوره و انجام هرس سبز)
- استفاده از تهویه مناسب با شرایط اقلیمی

استان اردبیل:

- مدیریت دما و رطوبت گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها، سردخانه ها و واحدهای تولیدی
- تسریع در انتقال محصولات برداشت شده به مکان های مسقف
- عدم تردد و چرای دام در ارتفاعات به علت احتمال وقوع رعد و برق
- انجام بهداشت و پاکسازی باغات
- مدیریت زهکشی مزارع و باغات در زمان بارندگی جهت جلوگیری از ماندابی
- بررسی استحکام سازه های گلخانه ای و حفاظت از ادوات کشاورزی در برابر باد شدید
- پایش باغات و مزارع از لحاظ آفات و بیماری و انجام اقدامات لازم با مشاوره کارشناسان جهاد کشاورزی

استان اصفهان :

- آماده سازی مزارع جو جهت کشت بموقع
- مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای انارستانها در مناطق شمالی و شرقی استان
- آمادگی جهت برداشت ذرت بویژه در مناطق شرق
- غرب و جنوب بعلت پیش بینی بارشهای زودهنگام و بیش از نرمال پاییزه
- برداشت ذرت در مزارعی که در حالت خمیری هستند در ساعات خنک
- آماده سازی بستر کشت کلزا و مصرف سم ترفلان پیش کاشت جهت کنترل علفهای هرز پهن برگ و باریک
- کنترل درجه حرارت انبارهای سیب زمینی

استان البرز :

- استفاده از «کود اوره» در مزارع ذرت
- اقدام لازم برای مبارزه با «سرخرطومی» در مزارع یونجه
- اقدام لازم برای مبارزه با آفات مکنده در مزارع سبزی و صیفی
- استفاده از کودهای «پتاسه» در مزارع پنبه
- اقدام به محلول پاشی با «فروت ست»، پس از برداشت محصول در باغات
- مدیریت دما در روزهای آینده در واحدهای گلخانه ای، تولید دام و طیور و قارچ

استان ایلام :

- از انجام عملیات محلول پاشی در زمان وزش باد خودداری کرده و این عملیات را به ساعات آرام و مناسب روز موقوف نمایند.
- نسبت به بازدید و پایش مستمر مزارع و محصولات در حال کشت از نظر آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز اقدام و عملیات کنترل را با رعایت شرایط جوی انجام دهند
- آبیاری مزارع بر اساس نیاز آبی محصول، شرایط رطوبتی خاک و وضعیت آب‌وهوایی منطقه تنظیم شود و از آبیاری بی‌رویه جلوگیری گردد
- در مناطق مرزی و مستعد وزش باد، از انجام عملیات خاک‌ورزی غیرضروری که موجب افزایش فرسایش بادی و کاهش رطوبت خاک می‌شود، خودداری شود
- نسبت به حفظ بقایای گیاهی و پوشش سطح خاک در مزارع به منظور کاهش تبخیر، حفظ رطوبت خاک و جلوگیری از فرسایش بادی توجه شود

استان بوشهر :

- با توجه به وزش ملایم باد، تداوم شرجی و گرمی هوا، توجه به میزان رطوبت سطح خاک و آبیاری نخیلات و مرکبات.
- مجاز به هر گونه سمپاشی و محلول پاشی (طی صبح و بعدازظهرها) در روزهای آبی در باغات مرکبات و نخیلات.
- تغذیه متناسب و استفاده از قارچکش‌های محافظتی برای درختان در باغات مرکبات و نخیلات.
- در پی وزش ملایم باد، تداوم شرجی و گرمی هوا، توجه به رطوبت و تهویه مطبوع محیط گلخانه‌ها
- پایش و کانون کوبی سفیدک برگی در محصولات جالیزی و مصرف انواع قارچکش‌های محافظتی در محصولات گلخانه‌ای.
- در صورت روئیت و ازدیاد پروانه مینوز، مصرف انواع آفت کش‌ها و سم پاشی محصولات گلخانه‌ای

استان تهران :

- استفاده از کودهای ریز مغذی کامل در باغانی که برداشت محصول آنها به پایان رسیده است
- کشاورزان از روشن کردن آتش در مزارع و آتش زدن کاه و کلش با وجود وزش باد خیلی شدید اجتناب کنند
- آماه سازی اراضی جهت کشت پاییزه غلات و با توجه به مناسب بودن دما عملیات کشت کلزا در مزارع آغاز شود

استان چهارمحال بختیاری :

- عدم انجام آبیاری بارانی مزارع لوبیا در ساعات صبح با توجه به خنک شدن هوای صبحگاهی طی روزهای آینده، جهت جلوگیری از شیوع بیماری سوختگی باکتریایی شاخ و برگ لوبیا.
- اتخاذ تدابیر لازم (کوددهی پتاسه و فسفره) جهت افزایش مقاومت به سرما در محصولات حساس مانند لوبیا و ذرت با توجه به افت نسبی دمای صبحگاهی طی روزهای آینده.
- آمادگی لازم جهت انجام کشت های پاییزه با توجه به احتمال آغاز زود هنگام و فراتر از نرمال بارش های پاییزه.
- تقویت و کوددهی باغات (با کودهای پتاسه) جهت افزایش مقاومت درختان به تنش های محیطی و افزایش کیفیت و عملکرد میوه ها.
- رعایت بهداشت عمومی باغات پس از برداشت محصول (حذف و هرس و جمع آوری شاخه ها و میوه های آلوده به زنگوله مغزخوار بادام، سرشاخه خوار هلو و ...).
- تنظیم و کنترل دما، رطوبت و تهویه گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به روند کاهشی دما طی روزهای آینده.
- آمادگی لازم جهت انتقال کندوها به مناطق گرمسیر و استقرار در مناطق بالادست با توجه به تغییر فصل و شروع زود هنگام بارش های پاییزه

استان خراسان جنوبی :

- برداشت محصولات عناب و انگور به تعویق نیفتد
- محل نگه داری محصولات از باد و باران ایمن باشد

- پوشش گلخانه ها مستحکم باشد
- آبیاری با رعایت نیاز گیاه صورت پذیرد. برداشت محصولات به تاخیر نیفتد

استان خراسان رضوی :

- با توجه به تاریخ کشت ارقام زمستانه گندم در مناطق سردسیر نسبت به آماده سازی بستر بذر و کشت اقدام شود
- به دلیل اهمیت تاریخ کشت کلزا در موفقیت تولید کشت آبیاری در مناطق سردسیر و معتدل سرد از ابتدای شهریور تا ۱۰ مهر اقدام گردد. تاخیر در کشت موجب خسارت سرمازدگی خواهد شد
- به جهت ممانعت از بروز خسارت سرمای زودرس پاییزه پنبه و جلوگیری از شیوع آفات مکنده مانند عسلک و شته در مزارع حداکثر تا پایان شهریور نسبت به قطع آبیاری مزارع پنبه اقدام شود
- استفاده از کودهای پتاسه و کودهای کامل میکرو در مزارع گوجه فرنگی و سیب زمینی
- احتیاط در سمپاشی و محلول پاشی مزارع با توجه به وزش باد شدید

استان خراسان شمالی :

- تجهیز چاه های عمیق، مرغداری ها، گلخانه ها و به مولدهای برق جایگزین بویژه پنل های خورشیدی (با توجه به احتمال قطعی برق و رخ داد تنش)
- انتقال محصولات برداشت شده به انبارهای مسقف و استاندارد
- در صورت نیاز تسریع در ترمیم اماکن نگه داری دام و طیور و تنظیم دما و شرایط محیطی
- تهیه سوخت جایگزین کافی برای مرغداری ها و گلخانه ها
- استفاده از سموم کم خطر در صورت نیاز به سمپاشی توسط باغداران و زارعین محترم و اطلاع به زنبورداران یک روز قبل از سمپاشی جهت جابجایی کندوها

استان خوزستان :

- تعمیر و ترمیم و لایروبی زهکشها و کانالهای آبرسانی
- پایش مستمر آفات و بیماریهای محصولات تابستانه (بلاست و کرم ساقه خوار و برگخوار پاییزه)
- پیش بینی قطع برق و اتخاذ تمهیدات لازم
- تأمین سایه مناسب (سایه بان) برای دامها
- ادامه برداشت خارک و رطب و مدیریت صحیح برداشت و پس از برداشت - تسریع در انتقال محصول برداشت شده به بازار
- ایمن سازی و مقاوم سازی گلخانه ها با توجه به احتمال بارش های شدید طی فصل زراعی پیش رو
- هرس سبک تابستانه شامل حذف باجوش ها و شاخه های آلوده
- ایمن سازی و مقاوم سازی جایگاه و سالن طیور با توجه به احتمال بارش های شدید طی فصل زراعی پیش رو

استان زنجان :

- خودداری از دپو محصولات برداشت شده در مزارع
- مبارزه با آفات و بیماری های محصولات بهاره
- احتیاط عشایر و دامداران در عبور از ارتفاعات و حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به شرایط جوی
- احتیاط در سم پاشی و محلول پاشی با توجه به شرایط جوی
- خودداری از ایجاد آتش و رها کردن وسایل منجر به آتش به جهت جلوگیری از آتش سوزی در مراتع و سرایت آن
- بسته نگه داشتن دریچه های گلخانه ها

استان سمنان :

- انتقال دامهای سنگین در اواسط روز به زیر سایبان جهت جلوگیری از تنش های گرمایی
- تنظیم نور و دمای گلخانه ها و کنترل سطوح پوششی و دریچه سالنها
- مهار سیستمهای آبیاری بارانی و استفاده از قییم برای نهالهای جوان

- خودداری از سم پاشی و محلول پاشی ها باغات و مزارع قبل از بارندگیها
- پاکسازی مسیرها و کانالهای انتقال آب به مزارع و باغات جهت جلوگیری از آلودگی اراضی

استان سیستان و بلوچستان :

- تسریع در برداشت خرما ، انار ، پسته و دیگر محصولات باغی و زراعی استان
- برنامه ریزی برای کشت در سال زراعی جدید با توجه به آغاز بارش های زودهنگام در پاییز
- برنامه ریزی، مرمت و بازسازی قنوات با توجه پیش بینی بارش های مطلوب در پاییز
- تهیه مناسب و استفاده از مه پاش در ساعات اوج گرما در دامداری ها جهت کاهش تنش به گاوهای شیرده
- تسریع در برداشت عمل و نظارت بر وضعیت زنبورها به منظور کاهش استرس های احتمالی پس از برداشت
- رعایت مستمر بهداشت باغ و مبارزه با آفات و بیماری ها، آبیاری و محلول پاشی متناسب باغات بعد از برداشت محصول

استان فارس :

- انجام آبیاری منظم مزارع بر اساس نیاز رطوبتی محصول با توجه به وضعیت جوی
- انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از صدمات ناشی از سرمازدگی و یخبندان در مناطق سردسیر
- خودداری از سوزاندن بقایای گیاهی در مزارع غلات پس از برداشت و برگرداندن آنها به خاک جهت اجرای برنامه کشاورزی حفاظتی.
- آماده سازی بستر کاشت زراعت های پاییزه
- کشت گندم و جو آبی و دیم علیرغم پیش بینی احتمال بارندگی های زودهنگام
- تنظیم دور آبیاری در باغات به منظور تأمین رطوبت کافی خاک و جلوگیری از تنش های محیطی، کاهش کیفیت میوه ، ترکیب و بدشکلی میوه
- نصب توری در پنجره ها و ورودی ها به منظور جلوگیری از ورود آفات از مزارع مجاور به داخل سالن های گلخانه
- بازدید و مستحکم نمودن سازه، پوشش گلخانه ها و...
- تنظیم دما و رطوبت و تهیه سالن پرورش طیور

استان قزوین :

- بعد از بارندگی مزارع گوجه فرنگی برای جلوگیری از بیماری با ترکیبات مسی سمپاشی شود.
- آغاز کشت کلزا و تسریع در برداشت ذرت علوفه ای و گوجه
- تسریع در برداشت انگور و تسریع در جمع آوری کشمش در بارگاه های انگور

استان قم :

- سمپاشی مزارع ذرت
- سمپاشی مزارع یونجه برای مقابله با شته سبز یونجه
- شروع آماده سازی اراضی کشت پاییزه
- اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه برگ خوار پاییزه در ذرت و چغندر علوفه ای
- استفاده از دو ترکیب سولفات روی و سولفات پتاس جهت رشد مطلوب پیوندک های تازه رشد کرده در درختان گردو
- استفاده از ترکیب سولفات آمونیوم در باغات پسته

استان کردستان :

- تهیه بستر و تدارک نهاده های مورد نیاز کشت های پاییزه
- تهیه بستر و انجام کشت کلزا • جلوگیری از آتش زدن بقایا در مزارع برداشت شده غلات پاییزه
- آبیاری مزارع در ساعات خنک شبانه روز و خارج از پیک مصرف برق
- تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ خوراکی

استان کرمان :

استان کرمانشاه :

- مدیریت آبیاری مزارع چغندر قند و سیب زمینی جهت برداشت در زمان مناسب
- برداشت به موقع ذرت علوفه ای.
- مدیریت آبیاری باغات انگور (در حال رسیدن) به منظور جلوگیری از کمبود رطوبت خاک، که باعث کاهش کمی و کیفی میوه می گردد.
- مبارزه با آفت کنه دونقطه ای در گلخانه ها

استان کهگیلویه و بویراحمد :

استان گلستان :

- خودداری از برداشت وش های پنبه در اوایل صبح به دلیل رطوبت بالای وش ها
- برداشت مزارع پنبه روزهای سه شنبه و چهارشنبه با توجه به پایداری جو و افزایش دما
- کنترل آفات مکنده بویژه سنک و عسلک ها در مزارع پنبه و سویا
- انجام برداشت شالی با توجه به پایداری جو در این هفته
- برداشت محصول ذرت که به مرحله خمیری دانه رسیده با توجه به پایداری جو
- استفاده از هورمون های اختصاصی کنترل کننده رشد پنبه در صورت مشاهده رشد رویشی بیش از حد بوته

استان گیلان :

- تخلیه آبهای اضافی در مزارعی که برای کشت دوم آماده شده اند
- انتقال سریع شیر دوشیده شده به محل های جمع آوری جهت جلوگیری از فاسد شدن آن
- بستن مبادی ورودی آب در استخر های سرد آبی جهت جلوگیری از ورود آب گل آلود و جلوگیری از تلفات ناشی از آن
- رعایت فاصله در جوجه ریزی به منظور جلوگیری از تراکم در امر پرورش

استان لرستان :

- تسریع در آماده سازی بستر کشت های پاییزه
- کاشت کلزا در مناطق گرم و معتدل استان و آبیاری کلزا های کشت شده در مناطق سرد
- کاهش حجم آب مصرفی در مزارع و کاهش دور آبیاری بخصوص در مزارع حبوبات
- برداشت گردو جهت جلوگیری از سیاه شدن مغز میوه
- مقاوم سازی و اطمینان از استحکام سازه های گلخانه در مقابل وزش باد

استان مازندران :

- انجام عملیات شخم و شیار به منظور آماده سازی اراضی کشاورزی جهت کشت محصولات پاییزه (گندم، جو، کلزا، کاملینا، تریکاله و ...)
- ردیابی و کنترل عوامل خسارتزا (بیماری بلاست و آفت کرم ساقه خوار برنج) در اراضی شالیزاری رتون و کشت مجدد
- استفاده کودهای تقویتی دارای پتاس بالا به همراه جلبک دریایی در باغ های مرکبات بویژه نارنگی های پیش رس (به منظور تکمیل دوره رشد میوه)
- نمونه برداری از برگ درختان مرکبات (آنالیز یا تجزیه و تحلیل برگ) جهت تشخیص کمبود یا بیش بود عناصر غذایی
- ردیابی و کنترل شپشک آرد آلو در باغ های مرکبات

استان مرکزی :

- ادامه عملیات مبارزه با آفات و بیماری ها علی الخصوص مبارزه با کنه های نباتی در باغات
- پایش باغات و برداشت میوه های رسیده بخصوص انگور

- ادامه عملیات مبارزه با آفات و بیماری ها علی الخصوص مبارزه با کنه های نباتی در مزارع کشت های بهاره از جمله لوبیا، سیب زمینی، ذرت و صیفی جات و ... با سموم مناسب و کنه کش اختصاصی و انجام عملیات فروت ست (تغذیه جایگزینی میوه)
- شروع کشت کلزا در مناطق سردسیر استان

استان هرمزگان :

- انتقال و کاشت نشا بادمجان، پیاز و گوجه فرنگی در ساعات خنک و همزمان با آبیاری.
- احتیاط در تردد و چرای دامها در ارتفاعات و مسیر رودخانه های فصلی.
- خودداری از غذا دهی در مناطق کم عمق استخرها در ساعات گرم روز. استفاده از دستگاه هواده در ساعات افت جریان باد.
- آبیاری سنگین و غرقابی بعد از برداشت مرکبات و نخیلات توصیه می گردد
- تهیه ی رطوبتی سالن های مرغداری در طول شبانه روز

استان همدان :

- چغندرکاران استان نسبت به برداشت محصول با هماهنگی کارخانه قند اقدام نمایند.
- مدیریت برنامه کودهای ازته در مزارع سیب زمینی و چغندر قند جهت جلوگیری از رشد بی رویه اندام های هوایی و تاخیر در غده زائی، با توجه به پیش بینی احتمال بارندگی های زودرس پاییزه
- استفاده از محلول پاشی سولوپتاس و آمینو کلسیم در مزارع سیب زمینی و چغندر قند به منظور تسریع در غده زایی و ممانعت از تنش های احتمالی سرمایی در اواخر شهریور و اوایل مهرماه.
- کاشت کلزا در شهرستان های جنوبی تا ۱۰ مهر (به غیر از مناطقی از کلیایی و چهاردولی شهرستان اسدآباد) و در شهرستان های شمالی حداکثر تا اول مهر
- تنظیم برنامه آبیاری مزارع سیب زمینی بر اساس پیش بینی هفتگی هواشناسی، به منظور ایجاد شرایط رطوبتی مناسب جهت برداشت محصول
- کشت گندم و جو آبی و دیم علیرغم بارندگی های زودهنگام پاییزی، زودتر از ۱۵ تا ۲۰ مهر ماه توصیه نمی گردد
- برداشت و جمع آوری محصول یونجه با در نظر گرفتن پیش بینی هفتگی هواشناسی.
- انجام تمهیدات لازم جهت برداشت انگور و تهیه کشمش در فضای باز با توجه به پیش بینی بارش های زودهنگام در مهرماه

استان یزد: