

# برنامه غذایی عمومی خرما بر اساس سبد آرمان سبز آدینه



Follow: armansabzadineh  
@armansabzadineh

پیشنهاد می گردد جهت بهبود رشد میوه ها و افزایش کیفیت محصول و همچنین جلوگیری از اثرات منفی تنش های محیطی از کودهای محرک رشد آکادین به میزان ۲/۵ کیلو در آب آبیاری و یا محلول پاشی استیمپلکس به میزان ۲ در هزار در طول دوره استفاده گردد.

در صورت بروز کمبود هر کدام از عناصر کم مصرف و پر مصرف از کلات های ون ایپرن یا آمینو کولانت های بایوبریکا پیشنهاد می گردد.

به منظور کاهش تنش شوری اطراف ریشه در خاکهای دارای EC بالا محلول Out Salt به میزان ۲۵ لیتر در هکتار در ۴ مرحله به فاصله ۲۰ روز پیشنهاد می گردد.

محلولپاشی یک دوره ریز مغذی زینک تاپ پلاس به مقدار ۲ در هزار در طول دوره در مرحله گل دهی پیشنهاد می شود.

مصرف آهن خاکی سکنیا الترا\* در طی دوره تشکیل میوه ها یک مرتبه توصیه می شود.

به دلیل احتمال برگ سوزی زمان محلول پاشی می بایست در صبح زود و به دور از نور مستقیم آفتاب باشد. (غلظت های توصیه شده می بایست رعایت گردد). در زمان تنش شدید خشکی از مصرف کود های شیمیایی خودداری شود، مواردی که با ستاره (\*) مشخص شده اند غیر قابل اختلاط هستند.

زمان	نوع کود	نحوی مصرف	مقدار مصرف (هکتار)
با اولین آبیاری	اوره فسفات ون ایپرن	همراه آبیاری	۱۵ کیلوگرم
	هیومیکس ۹۵		۸ کیلوگرم
قبل از گلدهی	۲۰-۲۰-۲۰ یوگاریت	همراه آبیاری	۱۵ کیلوگرم
پس از تشکیل میوه	وزاویوس	محلولپاشی	۱ در هزار
	استیمپلکس		۲ در هزار
با رشد میوه ها	۱۰-۱۰-۳۰ ون ایپرن	همراه آبیاری	۲۵ کیلوگرم
	سولفات پتاسیم داناتک		۲۵ کیلوگرم
یک ماه قبل از برداشت	۱۲-۱۲-۳۶ یوگاریت	همراه آبیاری	۲۵ کیلوگرم

\* توجه: موارد توصیه شده کاملا عمومی می باشد و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد، به دلیل آنکه این شرکت از زمان مصرف، نحوی مصرف و دز مصرف و شرایط جوی مصرف توسط مصرف کننده بی اطلاع است لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت وارد کننده نخواهد شد. قبل از استفاده از توصیه های فوق با کارشناسان شرکت و یا کارشناسان متخصص گیاه پزشکی مشورت گردد.

<http://armansabz.adinegroup.com>

جهت کسب اطلاعات تکمیلی با ما تماس حاصل فرمایید تلفن تماس: ۰۲۱-۸۳۵۰۷۳۴۴