

فن پروپاترین ۱۰ % امولسیون

Fenpropathrin 10% EC



موارد مصرف :

میزان مصرف	آفات	محصول
۲ در هزار	کنه قرمز اروپایی	درختان میوه سردسیری

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برجسب آفت کش به پزشک مراجعه گردد.

یادزهر:

دیازپام (یادزهر واقعی نیست و فقط سیستم اعصاب مرکزی را تسکین میدهد)

فرمول شیمیایی: $C_{22}H_{23}NO_3$

وزن مولکولی: (۳۴۹/۴)

گروه Pyrethroid

ماده مؤثر: ۱۰۰ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۹۰۰ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rats 70.6 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO :

II (سمی و زیان‌آور)

نحوه تأثیر:

حشره کش و کنه کش گوارشی و تماسی و دور کننده



کنه قرمز اروپایی

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.