

Flumite 20% SC



موارد مصرف :

مقدار مصرف	آفات	محصول
۰/۳ در هزار	کنه قرمز اروپایی	سیب
۰/۴ در هزار	کنه تارتن	رز گلخانه‌ایی

فرمول شیمیایی: C14H7N4CLF2

وزن مولکولی: (۳۰۴/۶۸)

گروه: Tetrazine

ماده مؤثر: ۲۰۰ گرم بر لیتر

مواد همراه: ۸۰۰ گرم بر لیتر

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for male Rats 979.09 mg/kg and for female

Rats 594.02 mg/kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO :

II (سمی وزیان‌آور)

نحوه تاثیر:

کنه کش تماسی، با خاصیت ترانسلامینار و با اثر طولانی که داخل بافت گیاه نفوذ کرده و بر تخم و مراحل غیر بالغ کنه اثر گذاشته و سبب عقیم شدن کنه ماده می شود.

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سر درد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب کنه کش به پزشک مراجعه گردد.

پایزهن:

فلومایت پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

مدیریت کاربرد:

فلومایت منطبق با مدیریت تلفیقی آفات (IPM) می باشد و وقوع بارندگی پس

از مصرف تاثیری در آن ندارد. برای زنبور عسل و ماهی سمیت ندارد

دوره کارنس:

میزان مصرف این کنه کش برای محصول سیب ۲۸ روز می باشد.



کنه قرمز اروپایی



کنه تارتن

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.