

مولینیت ۷۱ % امولسیون + ۱۲۰ گرم اکستندر

Molinate 71%EC+120gr Extender



موارد مصرف :

مصرف	نوع علف‌هرز	میزان و زمان مصرف
برنج	سوروف (کشیده برگ)	۶-۵ لیتر در هکتار قبل از ۲ برگی شدن سوروف و قبل از کشت در خزانه

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود.

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب علف کش به پزشک مراجعه گردد.

یادآوری:

آتروپین . هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

فرمول شیمیایی: $C_9H_{17}NOS$

وزن مولکولی (۱۸۷/۳)

گروه: Thiocarbamate

ماده مؤثر: ۷۱۰ گرم برلیتر

اکستندر: ۱۲۰ گرم برلیتر

مواد همراه: ۱۷۰ گرم برلیتر

درجه سمیت برای بیستاداران:

Oral LD 50 for rats 369 (male), 450 (female) mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان آور)

نحوه تأثیر:

انتخابی، سیستمیک: مانع جوانه زدن، بازدارنده سنتز چربی.



سوروف

زیر نظر متخصصین گیاهپزشکی مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.

1394 - 1395

www.adinehgroup.com