

پروپیکونازول ۲۵٪ امولسیون

Propiconazole 25 % EC



موارد مصرف :

ملاحظات	میزان مصرف	بیماری	محصول
	۵/۰ لیتر در هکتار	انواع زنگ	گندم
یک نوبت سمپاشی در مرحله گل‌دهی (در صورت نیاز تکرار سمپاشی به فاصله ۷ روز)	۱ لیتر در هکتار	فوزاریوم خوشه	
در صورت آلودگی ۲٪ از ساله‌ها	یک لیتر در هکتار	شیت بلایت	برنج

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی

کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب قارچ کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر:

پروپیکونازول پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خوراندن نشود.

دوره کارنس:

فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول برنج، گندم ۳ روز است.

مدیریت کاربرد:

این سم بازدارنده دی متیل‌سیون استروبییدها است .

فرمول شیمیایی: $C_{15}H_{17}Cl_2N_3O_2$

وزن مولکولی: (۳۴۲/۲)

گروه: Triazole

ماده مؤثر: ۲۵ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۷۵ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای بیستاداران:

Oral LD50 for rats 1517 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

II (سمی و زیان آور)

نحوه تأثیر:

پروپیکونازول قارچ‌کشی سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج با خاصیت جابجایی در برگ به ریشه و بر عکس می باشد که این عمل از طریق آوند چوبی انجام می شود.

احتیاطات لازم:


از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.



فوزاریوم



فوزاریوم



زنگ قهوه ای غلات



زنگ زرد غلات

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.