

کاربندازیم ۶۰٪ پودر با قابلیت ترشوندگی

Carbendazim 60 % WP



موارد مصرف :

میزان مصرف	بیماری	محصول
۲ در هزار ضدعفونی بذر	سیاهک آشنکار و پنهان	گندم
۲/۵ در هزار (ضدعفونی بذر) با در زمان آلودگی یا شدت بالا	سیاهک آشنکار و پنهان	گندم و جو

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی

کمکهای اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب قارچ کش به پزشک مراجعه گردد.

پادزهر:

انواع باریتورات ها. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورنده نشود.

مدیریت کاربرد:

این سم دارای نمک های فسفات هیدروکلراید هیپوفسفیت است.

فرمول شیمیایی: $C_9H_9N_3O_2$

وزن مولکولی: (۱۹۱/۲)

گروه: Benzimidazole

ماده مؤثر: ۶۰۰ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۴۰۰ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD₅₀ for rats > 6400 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

U (سمیت حاد ندارد)

نحوه تأثیر:

کاربندازیم قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی است که از طریق ریشه و

نسوج سبز جذب و منتقل می شود.



سیاهک آشنکار گندم



سیاهک پنهان گندم

زیر نظر متخصصین گیاهپزشکی مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.

1394 - 1395

www.adinehgroup.com