



مانکوزب ۸۰٪ پودر با قابلیت ترشوندگی Mancozeb 80% WP

موارد مصرف :

مجموعه	بیماری	میزان مصرف
گندم	سیاهک پنهان	۲ در هزار بصورت ضدعفونی بذر
مرکبات	کنه نقره ای	۲ در هزار
پادام	لکه آجری	۲ در هزار
نخود	برق زدگی	۲ در هزار
پونجه	سفیدک داخلی	۲ در هزار
نونون	سفیدک داخلی	۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار
میخک	زنگ	۲-۱/۵ در هزار به صورت پیشگیری همراه با مویان به نسبت ۵/۵ در هزار

علائم مسمومیت:

سردرد، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی

کمکهای اولیه:

در صورت مسمومیت به همراه برچسب قارچ کش به پزشک مراجعه گردد.

یادآهنگ:

سولفات آتروپین. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

مدیریت کاربرد:

استفاده مانکوزب روی سبزیجات و میوه جات ممنوع می باشد (مصوبه جلسه

۱۳۷۶/۰۷/۰۷ هیات نظارت بر سموم)

فرمول شیمیایی: $C_4H_6MnS_4$

گروه: Alkylenebis (Dithiocarbamate)

ماده مؤثر: ۸۰۰ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۲۰۰ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD₅₀ for rats > 5000 mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO:

U (سمیت حد ندارد)

نحوه تأثیر:

مانکوزب قارچ کش حفاظتی است

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری گردد.



سیاهک پنهان



سفرهک داخلی



خسارت کنه نقره ای

زیر نظر متخصصین گیاهپزشکی مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.