



استامپی پراید ۲۰% پودر قابل حل در آب
Acetamiprid 20% SP

موارد مصرف :

میزان مصرف	آفات	محصول
۵/۰ در هزار	مینوز لکه گرد	سیب
۵/۰ در هزار در مناطق کوهستانی برای مبارزه با نسل اول	کرم سیب	سیب
۲۰۰ تا ۲۵۰ میلی‌لیتر در هزار لیتر آب	پسیل	پسته

علائم مسمومیت:

سرردی، سرگیجه، تهوع، اسهال و اختلال در بینایی.

کمکهای اولیه :

در صورت مسمومیت به همراه برچسب حشره کش به پزشک مراجعه گردد.

یادها:

این سم پادزهر اختصاصی ندارد. هرگز به مسموم بیهوش چیزی خورانده نشود.

مدیریت کاربرد:

عدم استفاده برای نسل های ۴ و ۵ پسپیل پسته

دوره کارنس :

فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول ۲۸-۴۲ روز و برای کرم سیب

۱۴ روز است.

فرمول شیمیایی: $C_{10}H_{11}ClN_4$

وزن مولکولی: (۲۲۲/۷)

گروه: Neonicotinoid

ماده مؤثر: ۲۰۰ گرم بر کیلوگرم

مواد همراه: ۸۰۰ گرم بر کیلوگرم

درجه سمیت برای پستانداران:

Oral LD50 for Rats 217mg/Kg

کلاس سمیت بر اساس دسته بندی WHO :

II (سمی و زیان آور)

نحوه تأثیر:

حشره کش سیستمیک با فعالیت Translamin ar تأثیر تماسی و گوارشی.

استامپی پراید با اختلال در عمل گیرنده های عصبی نیکوتینیک استیل کوبین سبب

تأثیر در سیناپس های سیستم اعصاب مرکزی حشره می گردد.

احتیاطات لازم:

از خوردن، آشامیدن و کشیدن سیگار در حین سمپاشی اکیداً خودداری شود.



کرم سیب



مینوز لکه گرد



پسیل پسته

زیر نظر متخصصین گیاهپزشک مصرف شود.

توجه: موارد توصیه شده کلی بوده و به شرایط محیطی و امکانات موجود بستگی دارد. چون شرکت وارد کننده از نحوه شرایط نگهداری، زمان مصرف، مقدار دز مصرفی، چگونگی مصرف، شرایط جوی و محیط و اختلاط آن با سایر سموم و ترکیبات شیمیایی توسط مصرف کننده بی اطلاع می باشد، لذا هیچگونه مسئولیتی متوجه وارد کننده نمی باشد.